

Costas ist gelb an dem Grund und den Seiten in der Weise schwarz, dass der gelbe Theil fünfeckig mit parallelen Seitenrändern erscheint; der gelbe Theil bei *Pycn. striata* ist dagegen dreieckig und gewöhnlich durch eine schwarze Mittellinie getheilt. Durch die oben angegebenen generischen Merkmale tritt diese Art in die Gattung *Grypocoris* Dougl. et Sc., m. (Hem. Gymn. Eur. V, 146, XIX) ein. Von den früher bekannten Arten weicht sie besonders durch das etwa dickere erste Fühlerglied, wie auch durch die seitlich ein wenig mehr ausgedehnten Pronotum-Schwien ab; in der Kopfstruktur nähert sie sich dem *Grypocoris amoenus* Dougl. et Sc., Reut., Hem. Gymn. Eur. V, T. II, fig. 6 b. Ich beschreibe sie als

***Grypocoris Costae* n. sp.**

Niger, parum nitidus, parce tenuissime pallido-pubescentis; rostro pedibusque flavo-ferrugineis, illo apicem coarum intermediarum subattingente, articulo primo apice nec non apice ultimi nigris; femoribus seriatim nigropunctatis, tibiis pallidius flaventibus, breviter fuscospinulosis, apice cum tarsi nigris; antennis articulo primo basi augustissime flavente; vertice macula utrinque ad oculum, fronte guttula oblonga apicali, pronoto guttula media stricturae apicalis, margine laterali juxta callos, vitta sat angusta media longitudinali usque ad marginem basalem ducta, macula vittaeformi laterali utrinque illae parallela et a margine laterali remota, nec non margine tenui basali inter hemielytra, scutello macula magna media oblongo-pentagonali in apicem continuata lateribus parallela flavis; hemielytris ferrugineis, clavo margine scutellari vittisque duabus exterioribus venam terminantibus, corio sutura clavi, vitta longitudinali obliqua latiore juxta venam brachialem aliaqua juxta partem apicalem venae cubitalis nec non ipso margine laterali nigris; membrana obscure fumata, venis ferrugineis vel ochraceis, macula parva inter apicem cunei