

brana cinereo-fumata, parte apicali areolae majoris, areola minore arcubusque duobus venas inferne cingulantibus hyalinis; dorso abdominis nigro; vertice (σ^7) a tergo viso oculo fere duplo latiore; rostro coxas posticas parum superante; antennis articulo secundo margini basali pronoti aequelongo (σ^7); tarsis posticis longis, latitudini posticae capitis aequelongis et tibia circiter $\frac{5}{8}$ brevior, articulo tertio duobus primis simul sumtis fere dimidio longiore; pronoto disco postico subtiliter transversim strigoso. Long. σ^7 $4\frac{3}{4}$ mm.

Hab. in Austria (Radst. Tannen!), D. Handlirsch.

D. rufipenni Fall. minor, vertice maris latiore, rostro antennisque brevioribus, tarsis longioribus mox distinguendus, a *D. intermedio* Reut. tarsis posticis longioribus, latitudini capitis aequelongis, articulo tertio duobus primis simul sumtis fere dimidio longiore, signaturaque membranae, a *D. pseudosabinae* Osch. et Reut. statura majore, scutello hemielytris nitidis, his fasciis fuscis destitutis, antennis brevioribus, pronoto subtiliter transversim strigoso divergens. Caput basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustius, ab antico visum pronoto paullo longius, subaequaliter triangulare, a latere visum altitudine paullulum brevius, angulo faciali acutiusculo, genis (σ^7) oculo circiter $\frac{1}{3}$ humilioribus. Rostrum pallide flavo-virens, apice nigro. Antennae tenues, pallide flavo-virentes. Pronotum basi longitudine duplo latius, apice quam basi circiter $\frac{2}{5}$ angustius, breviter nigro-pilosulum. Hemielytra (σ^7) apicem abdominis sat longe superantia, rufescentia, cuneo saturatius rubro. Pedes flavo-virentes, femoribus nonnihil in rufescentem vergentibus, tibiis spinulis testaceis, tarsis articulo ultimo ipso apice fusco.

33. *Camptozygum pumilio* n. sp.

Oblongum, angustulum, sub-glabrum, hemielytreis tenuiter longius subaereo-pubescentibus; colore varians, capite varietatum obscuriorum saepe concolore, nigropiceo; antennis varietatum obscuriorum saepe nigropiceis,