

Antennae articulo secundo margine basali pronoti fere $\frac{1}{3}$ longiore. Pronotum strictura apicali excepta longitudine circiter duplo latius, lateribus late sinuatis, apice lateribus basiue magis minusve nigricanti-conspureatis, disco innoto. Hemielytra maris abdomen duplo longiora, ubique irregulariter parcius nigricanti-adspersa, macula apicali corii pallida interne macula nigricante majore terminata, angulo apicali exteriore corii nigro, cuneo apicem versus densius nigricanti-consperso; membrana hyalina, dense cinereo-fusco-irrorata, maculis duabus limbi exterioris vittaque apicali innotatis. Abdomen obscure fuscum, parcius testaceo-variegatum, ventre subtiliter grisescenti-pilosulo. Pedes pallide flaventes, subtiliter pallido-pubescentes, femoribus apicem versus nigricanti-conspureatis.

4. *Calocoris roseomaculatus* De G.

Var. decolor Reut.: Capite lutescente vel pallide flavo-virente, saepe vertice litura brevi angulata nigra; pronoto pallide et sordide flavo-virente, interdum vittis duabus levissime in ferrugineum vergentibus, raro angulis posticis anguste nigro-marginatis; scutello pallide flavo-virente, saepe linea longitudinali ferruginea vel nigricante; hemielytris sordide grisescenti-virentibus, vittis ferrugineis magis minusve interdum totis obsoletis; pedibus virescentibus, femoribus apicem versus in ferrugineum magis minusve vergentibus, tibiis apice tarsisque nigro-fuscis. ♀.

Algeria (Lambessa!), Corsica!, Austria (Josefsthal!), Triest!, Tauria! (Mus. Vindob.).

5. *Calocoris hispanicus* Gmel.

Var. erythronotum Reut.: Ut. var *nankinea* Duf., sed pronoto toto aurantiaco-rubro.

Tunisia, D. de Gaule (Mus. Paris.).