

8. *Halticus luteicollis* Panz.

Var. vitticeps Reut.: Ut *var. propinquus* H. S., sed capite vitta percurrente media, genis postice gulaque nigropiceis; coxis etiam anticis, apice excepto, femoribus omnibus, summo apice excepto, nigris.

Marocco (Tanger!), D. Favier (Mus. Paris.).

9. *Orthotylus curvipennis* Reut.

Oblongus, hemielytris explicatis abdomen longe superantibus (σ), vel breviter obovatus, hemielytris abdominis longitudine, margine externo apicem versus valde curvatis, cuneo latitudine multo breviore, margine externo membranae eidem margini cunei aequa longo (φ); prasinus, superne pilis brevibus albis micantulis densius pubescens, aliis longioribus fuscis magis distantibus; capite basi pronoti circiter $1/3$ (σ) vel vix $1/4$ (φ brachypt.) angustiore, vertice distinctissime marginato, oculo duplo (σ) vel fere duplo et dimidio (φ) latiore; rostro apicem coxarum posticarum attingente; antennis articulo primo apicem clypei dimidio longitudinis (σ) vel paullulum (φ) superante, secundo margine basali pronoti paullo (σ) vel paullulum (φ) longiore, ultimis simul sumtis secundo longioribus; membrana dilute fumata, venis pallide prasinis; femoribus posticis feminae distincte incrassatis; tibiis concoloriter spinulosis; tarsis posticis articulo tertio secundo longitudine subaeqvali. Long. σ $4^{2/5}$ — $4^{1/2}$, φ 3 mm.

Syn.: *Orthotylus (Allocotus) curvipennis* Reut., Gen. Cim. Eur. 36; *Allocotus* id. Reut. in Leth. et Put., Faun. d. Hem. de Biskra, 36, 16.

Hab. in *Salsolaceis* (Lethierry et Puton): Algeria (Biskra! D. D. Lethierry et Puton, D. Nouathier, copiose).

Descr.: Femina in Hem. Gymn. Eur. III, 372, 31, cum *O. rubido* Put. var. *Moncreaffi* Dougl. et Scott false con-