

noti aequo longo, ultimis simul sumtis secundo paullo longioribus; pronoto basi longitudine paullo magis quam duplo latiore, apice longitudine paullulum latiore; hemelytris abdomen longe superantibus, embolio apice cuneoque dimidio apicali, sutura membranae basin versus punctoque parvo anguli apicalis interioris corii (etiam in femina saepe distinguendo) griseis, cuneo angulo interiore late albido, forcipibus apice uncinatis. Long. $4\frac{1}{2}$ mm.

Biskra! et Oued-Rhir! ♂♀ copiose, D. Noualhier (Mus. Paris. et Helsingf.).

11. *Hypsitylus punctipes* Reut. Revue d'Ent.

XIII, 1894, 140, 11.

Mas (hactenus ignotus): capite basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$ angustiore, ab antico viso fortius transverso, vertice oculo circiter $\frac{2}{3}$ latiore, margine magis minusve distincte carinato; antennis articulo primo apicem clypei sat superante, apice interne atomis cinereis, secundo margine basali pronoti fere $\frac{1}{3}$ longiore; pronoto capiti aequo longo, basi longitudine duplo latiore, apice basi circiter $\frac{1}{3}$ angustiore; hemelytris abdomen fere dimidio longitudinis superantibus, punctis griseis dense conspersis (his punctis in femina saepe obsoletissimis); femoribus elongatis. Long. $3\frac{1}{2}$ —4 mm.

Biskra! D. Noualhier (Mus. Paris.). Tunisia (Djilma!), D. de Vaulogier (coll. Montandon et Mus. Helsingf.).

12. *Tinicephalus pulcher* Reut.

Diagn.: Sordide virescenti-flavens, superne nigro-pilosus, pilis hemelytrorum subadpressis, hemelytris adhuc parcius pallido-pubescentibus; vertice punctis fuscis in arcum latum postice concavum dispositis; hemelytris purpureis, venis omnibus, clavo sutura anguste, margine scutellari commissuraque late, corio limbo laterali plagaque inter venas