

latis, in genas longius extensis; rostro gracili, coxas posticas distincte superante: antennis ad apicem oculorum interne insertis, articulo primo apicem clypei paullo superante, secundo latitudine capitis sat multo longiore: pronoto fortiter transverso, trapeziformi, margine apicali late sinuato; scutello basi detecto; femoribus punctis destitutis, posticis fortiter dilatatis, tibiis spinulis albidis e punctis fuscis nascentibus, tarsis posticis articulo tertio secundo fere aequae longo, unguiculis leviter curvatis, aroliis haud distinguendis.

*Descr.:* Generi *Psallopsis* Reut. sat similis, differt vertice immarginato, clypeo a fronte leviter discreto, antennis ad ipsum apicem oculorum interne insertis, articulo primo apicem clypei superante, pronoto margine apicali distincte lateque sinuato, femoribus setis exsertis rigidis destitutis aroliisque unguiculorum haud distinguendis; ab *Atomosceli* Reut. fronte subperpendiculari vix convexiuscula, genis humilibus, rostro longiore, antennarum articulo tertio quarto multo longiore, structura tarsorum distinguendus; ab *Anonychia* Reut., cui aroliis nullis affinis, vix nisi rostro longiore, antennis multo longioribus, femoribus punctis nigris destitutis divergens.

### **Compsonannus puncticornis Reut.**

*Diagn.:* Albidus, opaculus, tenuiter albicanti-pubescens, capite, vertice excepto, macula basali scutelli magis minusve distincta, fascia apicali corii externe late abrupta, mesosterno limboque anteriore femorum posticorum late fusco-ferrugineis; scutello hemielytrisque ubique atomis minutissimis cinerascens creberrime conspersis; hemielytris margine exteriore corii et cunei punctis minutis fusco-ferrugineis signato, membrana hyalina cum areolis dense fusco-irrorata; antennis articulo primo basi punctoque ante apicem, secundo punctis tribus, ultimo mox pone medium posito, fusco-ferrugineis; femoribus anterioribus tibiisque anterioribus, his solum basin versus, dense fusco-ferrugineo-conspersis, tibiis