

omnibus spinulis albidis e punctis minutis fusco-ferrugineis nascentibus. Long. ♀ 2 $\frac{3}{7}$  mm.

*Hab.* in Algeria (Biskra!), D. Noualhier (Mus. Paris.).

*Deser.:* Signaturis *Psallo nebuloso* Reut. nonnihil similis, notis genericis mox distinguendus. Caput (♀) basi pronoti circiter  $\frac{2}{5}$  angustius, ab antico visum latitudini frontis oculique unico longitudine subaeqvale, a latere visum altitudine basali circiter  $\frac{1}{3}$  brevius, vertice oculo  $2\frac{2}{5}$  latiore. Rostrum apice nigro. Antennae articulo secundo margini basali pronoti fere aequo longo, sub-lineari, tertio secundo vix  $\frac{1}{4}$  breviore, quarto tertio fere duplo breviore. Pronotum basi longitudine fere duplo et dimidio latiore, apice hac saltem dimidio latiore, lateribus margineque basali rectis, disco versus apicem leviter declivi, callis transversis sub-ochraceis. Scutellum basi ochraceum. Hemelytra (♀) apicem abdominis sat breviter superantia. Femora postica latitudine maxima vix magis quam triplo longiora. Pedes albidi, ut superne describitur signati. Tarsi toti albidi.

## 16. *Tuponia tamaricis* Perr.

*Var. cunealis* Reut.: superne albicans, basi scutelli ochracea vel fusca; clavo externe vel solum apice, corio juxta suturam clavi fasciaque anteapicali nec non macula media cunei ochraceis vel roseis; membrana fumata, venis maculaque ad apicem cunei albidis, vel albida, venis albidis, areola majore versus apicem minoreque fuscescentibus, areolis externe arcu fuscescente cinctis. ♀. A *T. Lethierryi* Reut. statura majore et robustiore mox distinguenda.

Madeira!, D. Fauvel (Mus. Paris.). Algeria (Constantine!), D. Prof. J. Sahlberg (Mus Helsingfors).