

17. *Tuponia Lethierryi* Reut.

Hem. Gymn. Eur. I, 30, 4.

Femina (hactenus ignota): inferne et superne albido-ochracea, pronoto postice, basi scutelli hemielytrisque reseis corii limbo laterali inaequaliter margineque apicali, cuneo limbis omnibus albidis; vertice oculo fere duplo latiore; antennis articulo secundo margine basali pronoti circiter $\frac{1}{4}$ brevior (in mare huic fere aequae longo); pronoto apice longitudine parum latiore.

Variat haec species venis membranae roseis vel plerumque albidis; membrana praecipue maris saepe obscurius fumata, areolis totis maculaque ad angulum earum adhuc obscurioribus.

Biskra! et Oued-Rhir!, ♂♀ copiose, D. Noualhier. (Mus. Paris. et Helsingf.).

18 *Tuponia Noualhierii* Reut.

Diagn.: Superne dilute virescenti-flavens vel pallide ochracea, femina fere albido-ochracea, longe albo-pubescentis, femina fere unicolor, fronte interdum medio leviter fuscescente, mas scutello vitta media virescente, corio saepe apicem versus minute virescenti-conspurcato, embolio apice cuneoque vel saltem ejus marginibus virescentibus; membrana utriusque sexus tota albido-hyalina, venis pallide ochraceis; femoribus interdum virescenti-adsperis, inferne ante apicem punctis 3—4 fuscis in seriem obliquam positis interdum obsoletis aliisque 3—4 marginis inferioris, tibiis spinulis gracilibus fuscis in certa luminis directione pallidis et punctis nigro-fuscis distinctis nascentibus; capite parvulo basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustiore, ab antico viso latitudine frontis parum longiore, vertice oculo fere magis quam duplo (♂) vel saltem duplo et dimidio (♀) latiore; oculis fuscis, maris mediocribus, minute granulatis, subtransversim positis, supra superficiem verticis parum surgentibus; rostro apicem