

Arabia meridionalis (Aden!, m. decembris 1898), D. O. Simony (Mus. Vindob.).

Lygo cervino H. Sch. primo intuitu sat similis, margine corii laterali concolore, structura antennarum, spinulis tibi-
rum fuscis validioribus divergens, a *L. divergente* Reut., cui valde affinis, oculis maris paullulum majoribus, vertice inter illos paullo angustiore, colore femorum distinguendus. Caput verticale, ab antico visum latitudine verticis oculique unici parum longius, a latere visum altitudine duplo brevius, gula haud distinguenda, clypeo leviter prominente, basi a fronte leviter sed distincte discreto, angulo faciali recto. Rostrum apice nigro. Antennae articulo primo apicem capitis paullo superante, secundo fere quarta apicali parte nigro, tertio latitudini posticae verticis et oculorum longitudine subaequali. Pronotum basi longitudine paullo minus quam duplo latiore, apice longitudini aequo lato, disco sat aequaliter levius convexo, callis obsoletis concoloribus. Hemielytra abdomen sat longe superantia. Venter pallido-pubescentis, maris vitta utrinque picea, feminae adhuc medio lateribusque basin versus piceis.

12. *Camptbrochis Martini* (Put.) Reut.

Capsus Martini Put., Rev. d'Ent. VI, 306, 11! *Camptbrochis* id. Reut., Hem. Gymn. Eur. V, 39, 2! *Camptbrochis pallidus* Reut., Rev. d'Ent. IX, 255, 2!

Djibouti!, D. Coutière (Mus. Paris.). — (Algeria, Aegyptus; insula Cyprus, D. Goudry).

13. *Camptbrochis tibialis* n. sp.

Niger, nitidus, glaber, capite scutelloque laevibus, pronoto hemielytrisque punctatis; vertice margine postico, pronoto ipso margine basali, scutello apice vel toto, orificiis metastethii, tibiis annulo in tertia basali parte posito alioque latissimo infra medium, tibiatarum posticarum apicem subattinente, albidis; antennis articulo secundo margine basali pro-