

Capsidae novae rossicae

descriptae

ab

O. M. REUTER.

II.

1. Phytocoris longicornis Reut.

Superne ochroleucus, dense nigro-variegatus, longius
dense albo-tomentosus, pronoto parce nigro-setoso, hemiely-
tris pilis nigris adpressis; antennis corpore multo longiori-
bus, articulis duobus primis simul sumtis corpori, hemielytris
exceptis, aequo longis, primo pronoto capiteque a supero viso
parum breviore et margine basali pronoti paullo longiore,
secundo primo circiter duplo longiore, fusco-testaceo, basi
annulo albo crassitie articuli fere triplo latiore, annulo infra
hunc apiceque nigro-fuscis, tertio secundo fere duplo breviore,
fusco, annulo basali crassitie articuli saltem duplo latiore;
pronoto et scutello grisescenti-flaventibus, linea tenui media
pallida percurrente, illo latitudine basali solum circiter $\frac{1}{3}$
breviore, lateribus basin versus late sinuatis, disco postico
obscure cinereo-infuscato, sat nitido, ipso margine basali pal-
lido; hemielytris dense nigro-conspurcatis, corio apice macula
media basi angulata limboque externo cunei basi albidis; mem-
brana venis albis, vena cubitali nigra; pedibus albidis, femo-
ribus saltem dimidio apicali tibiisque nigro-maculatis, his an-
ticis nigro-annulatis; capite subverticali, a latere viso altitu-
dine breviore, fronte fortiter declivi, vertice (♀) oculo magno
parum magis quam $\frac{1}{4}$ latiore. Long. ♀ 6 mm.