

Rostrum rufescenti-flavens, articulo primo medium xyphi prosterne subsuperate, ultimo basi excepta nigro-piceo. Antennae mox infra medium orbitae interioris oculorum interne insertae. Scutellum modice convexum, laeve. Hemielytra laevia, lateribus corii pallidioribus. Tibiae spinulis crassitiei tibiae aequae longis. Tarsi margine inferiore articuli primi eodem secundi longiore. Segmentum maris genitale ad angulum sinus sinistri aperturae plica instructum, inferne carina media longitudinali bene elevata.

3. Charitocoris rufoplagiatus n. sp.

Pallide flavo-virens, nitidulus, scutello hemielytrisque subtiliter flavicanti-pubescentibus; capite callisque pronoti sordide rufescientibus vel dilute fuscescentibus; extremo apice rostri nigro; clavo intra venam usque ad medium commissurae, corio plaga obliqua in tertia apicali parte, margine interiore cunei venisque areolae minoris membranae sangvineis; femoribus posticis sat parce rufo-adspersis, tibiis breviter nigro-spinulosis, tarsis solum extremo apice cum ungivculis fusco; vertice (♀) oculo fere dimidio vel $\frac{2}{5}$ latiore. ♀. Long. $6\frac{1}{2}$, lat. $2\frac{1}{2}$ mm.

Caput Bonae Spei, D. Drège.

Ch. sangvineonotato Reut. signaturis sat similis, major et robustior, colore pallide flavo-vidente, vertice latiore, pronoto fortius transverso, basi concolore, cuneo margine interiore sangvineo tarsisque solum extremo apice angustissime fusco divergens. Caput (♀) nutans, basi pronoti fere duplo angustius, ab antico visum latitudine verticis oculique unici parum longius, a latere visum altitudine basali longitudine subaequale, vertice immarginato, sulco longitudinali destituto, fronte modice convexa, clypeo prominente, verticali, basi a fronte distincte discreto, ipsa basi in medio altitudinis capitis a latere visi posita, loris haud buccatis, genis humilibus, gula distincte obliqua, peristomio aequae longa. Oculi pronoto contigui, minute granulati, orbita interiore sinuati. Rostrum apicem coxarum intermediarum attingens. Antennae (♀) sat longe supra apicem oculorum interne insertae, articulo primo capite ab antico viso paullo breviore, secundo linearis, primo fere triplo longiore et margini basali pronoti aequae longo. Pronotum latitudine basali circiter