

basali pronoti circiter $\frac{1}{4}$ brevior. Pronotum latitudine basali duplo vel fere paullo magis quam duplo brevius, apice longitudine distincte latiore, lateribus rectis, disco interdum linea media longitudinali pallidior. Tibiae spinulis crassitie tibiae aequae longis, tarsis ipso apice articuli ultimi nigro, articulis duobus apicalibus tarsorum posticorum longitudine subaequalibus.

14. *Psallus proteus* Put.

Rev. d'Ent. VII (1889), p. 302.

Colore variabilis, superne nitidus, scutello hemielytrisque pronoto saturatius et obscurius coloratis, membrana aequaliter magis minusve fumata, venis flaventibus vel rufescentibus, macula parva hyalina inter apicem cunei et apicem areolae minoris, cuneo saepe margine interiore usque in apicem rubro; antennis pedibusque pallide flaventibus; illis articulo secundo margini basali pronoti longitudine subaequali (♀) vel hoc paullo longiore (♂); femoribus anticis solum puncto marginis antici ante apicem posito nigro, intermediis adhuc serie punctorum marginis posterioris, posticis puncto marginis antici antepicali inferneque punctis paucis sed sat magnis nigro-fuscis notatis, tibiis spinulis longis et validis nigris e punctis sat magnis geminatim positis nigro-fuscis nascentibus; segmento maris genitali inferne carina sat acuta longitudinali instructo. Long. ♂ $3\frac{1}{2}$, ♀ $3\frac{2}{3}$ mm.

Var. α, infuscata n.: Capite, callis pronoti, scutello hemielytrisque fusco-fuliginosis vel nigricanti-fuscis, margine postico verticis, pronoto, callis exceptis, scutello utrinque macula basali rufo-testacea, corio basin versus pallido, margine apicali corii anguste cuneoque, angulo interiore excepto, lividis; pectore rufo-testaceo, mesosterno nigro-fusco; ventre nigro-piceo, utrinque striis transversalibus rufo-testaceis. ♂.

Var. β, rubro-picta m.: Capite pronotoque flaventibus, scutello hemielytrisque fusciscenti-nigris, basi clavi, nec non basi apiceque corii anguste rubris, cuneo pallidissimo, apice nigricante. (Sec. Puton, mihi ignota.)