

18. Atractotomus brevicornis Reut.

Öfvers. Finska Vet.-Soc. Förh. XLII (1899), p. 140, 9.

Mas hactenus ignotus: Vertice oculo sat magno vix magis quam $\frac{1}{3}$ latio; antennis articulo secundo latitudine tota capitis haud longiore, sublineariter incrassato, basi primo aequo crasso, dein nonnihil crassiore, apice parum graciliore, duobus ultimis simul sumtis secundo vix longioribus, utroque secundo fere duplo breviore. Long. $2\frac{1}{5}$ mm.

Plurae specimina ($\sigma \varphi$) verisimiliter in *Pino haleppensi* ad Ragusam Dalmatiae in initio julii legit Clariss. Handlirsch (Mus. Vindob. et Helsingf.).

19. Plagiognathus cinerascens n. sp.

Pallide cinereus, superne pilis nigris facile divellendis adpressis vestitus, nitidulus, vertice punctis obsoletis fuscis in arcum positis, fronte macula media rotundata picea, medio linea pallida divisa, clypeo lorisque nigro-piceis; antennis (φ) articulo primo basi annuloque angusto anteapicali, secundo margini basali pronoti aequo longo, basi anguste nigro; corio vitta venam cubitalem interne terminante nigra; membrana sat obscure fumata, venis cinerascenti-albidis, extremo apice areola majoris, areola minore punctoque infra apicem venae cubitalis nigris, vitta ab hoc ad marginem exteriorem ducta nigricante maculam hyalinam inter apicem cunei et areolam minorem positam terminante, pone hanc striam macula alia magna medium limbi exterioris superante hyalina; mesterno segmentisque ventralibus nigris, marginibus harum segmentisque feminae genitalibus virescenti-cinereis; femoribus inferne seriatim nigro-punctatis, tibiis sat longe nigro-spinulosis, punctis nigris instructis, anterioribus circiter dimidio apicali inpunctatis, basi nigra, tarsis nigris. Long. $\varphi 3\frac{2}{3}$ mm.

Mongolia boreali (Mons Khingan: Louk-Sume!), D. Potanin (coll. Semenov).

Forsitan varietas insignis *Pl. fulvipennis* Kirschb. vel *obscuricipitis* Stål, ab ambabus colore cinereo, capite aliter