

picto, ab illo adhuc corio nigro-vittato, ab hoc areola majore membranae solum extremo apice nigricante divergens; a *Pl. lagiato* Reut., cui colore similis, statura minore, colore antenarum, areola majore membranae solum extremo apice nigricante tibiisque pallidioribus, distinctius nigro-punctatis longiusque spinulosis. Caput (♀) basi pronoti circiter $\frac{3}{7}$, angustius, ab antico visum latitudine frontis oculique unici paullo brevius, vertice oculo saltem duplo latiore. Rostrum coxas posticas paullulum superans. Antennae articulo secundo duobus ultimis simul sumtis paullo breviore. Pronotum basi longitudine duplo latius, callis saepe postice fusco-marginatis, angulis posticis saepe fuscescentibus. Hemielytra feminae abdomen breviter superantia. Femora marginibus concoloribus.

20. *Campylognathus fulvus* n. sp.

Superne, capite excepto, fulvus, inferne cum capite niger, margine verticis fulvo, antice impressionibus duabus transversis sat distinctis determinato; membrana cum areolis nigro-fumata, macula parva inter apicem cunei et areolam minorem hyalina; antennis articulo primo nigro, secundo nigro-fusco, tertia basali parte fulvo; pedibus fulvis; pronoto (♂) apice longitudine paullulum latiore. Long. ♂ $3\frac{1}{2}$ mm.

Insula Creta (Hag. Varvára!), D. Holtz (Mus. Vindob.).

Descr. Caput (♂) basi pronoti vix $\frac{1}{4}$ angustius, ab antico visum latitudine frontis oculique unici aequa longum, vertice oculo fere duplo latiore. Rostrum apicem coxarum intermediarum attingens, piceum, articulo primo medium xyphi prosterni subsuperante. Antennae (♂) articulo primo apicem clypei parum superante, secundo margine basali pronoti paullo longiore. Pronotum (♂) apice longitudine paullulum latiore, basi longitudine duplo latiore. Membrana venis fulvis. Xyphus prosterni convexus. Coxae anticae apicem mesosterni subattingentes. Tarsi articulo tertio secundo aequa longo, ungaviculis leviter curvatis, aroliis vix distinguendis.

