

sin versus fortiter divergentibus, angulis basalibus rectis, margine basali truncato parte anteriore circiter duplo latiore, disco subhorizontali, leviter convexo; scutello triangulari, plano, pronoto circiter duplo brevior; hemielytris hyalinis, maris abdomine fere duplo longioribus, parallelis, ad basin cunei nonnihil constrictis, clavo brevi, corio commissura margini interiore apicali fere aequae longa, cuneo valde elongato-triangulari, apice ultra areolam membranae sat longe producto, margine interiore late arcuato et cum margine apicali corii angulum obtusum formante; membrana areola unica apice interne late arcuata; xypho prosterni marginato; mesosterno horizontali; orificiis metastethii minutis, solum ad coxas distinguendis; pedibus longis, tenuibus, tibiis vix spinulosis, tarsis brevibus, articulo tertio duobus primis simul sumtis longiore, versus apicem incrassato, setis duabus longis divergentibus inter ungviculos.

Generi *Felisacus* Dist. (Faun. of Brit. Ind., Rhynch. II, p. 439) affinis, capite aequae longo ac pone oculos lato, vertice solum tenuissime sulcato, rostro brevior, pronoto strictura apicali multo brevior¹⁾, disco postico minus convexo, cuneo multo longiore, pedibus longioribus divergens.

Hyaloscytus elegantulus n. sp.

Fig. 1.

Pallide flavens, oculis, antennis, margine scutellari, commissura venaque clavi, commissura margineque apicali corii, ipso apice embolii, margine interiore cunei, vena membranae articuloque ultimo tarsorum fusco-nigris, margine exteriori corii tenuissime nigricante; capite linea laterali longitudinali ferruginea. Long. ♂ 4½ mm.

Victoria, 2 spp.

Caput a supero visum pronoto fere duplo brevius, vertice inter oculos oculo duplo latiore. Antennae articulo secundo primo circiter 1/3 longiore. Pronotum apice capite cum oculis saltem 1/3 et basi fere 2/3 angustius. Tibiae posticae margine corii exteriori parum longiores.

¹⁾ Sec. fig. 284 l. c. strictura apicalis longissima et lata, secundam descriptionem „very narrow“ (!).