

Hyalopeplus id. Kirk., Journ. Bomb. Soc. XIV (1902), p. 58, T. A., f. 8, T. B., f. 6.

Callicratides id. Dist., Fauna of Brit. India, Rhynch. II (1904), p. 417, 1358.

Queensland, Townsville, 6 spp., comm. D. Schouteden. Cum specimine e Ceylon, ubi hac species theam devastat, in omnibus congruentia, solum limbo laterali corii cuneoque paullo pallidioribus.

4. *Pseudopantilius* n. g.

Genus divisionis *Capsaria* m. Corpus magnum, oblongum, lateribus hemielytrorum parallelis; capite pronoto brevior et basi hujus fere duplo angustior, a supero viso latitudini basali aequae longo, a latere viso altitudine basali distincte longior, vertice et fronte horizontalibus, illo sulco medio longitudinali instructo, hac apice declivi; impressione obliqua utrinque supra scrobem antennarum; clypeo usque a basi late prominente, perpendiculari, margine anteriore basi arcuato, apicem versus levissime sinuato, basi altissime posita; angulo faciali recto, loris haud buccatis, genis altis, gula horizontali, dimidium capitis occupante; rostro apicem coxarum intermediarum attingente, articulo primo caput vix superante; antennis corpore cum hemielytris paullo longioribus paullo supra apicem orbitae interioris oculorum insertis, articulo primo cylindrico, capiti aequae longo, secundo longo, apice clavato, ultimis simul sumtis secundo saltem aequae longis, gracilioribus; pronoto leviter transverso, trapeziformi, versus apicem fortiter angustato, strictura apicali sat lata, lateribus obtusis, immarginatis, disco postico versus apicem declivi, parum convexo, callis obliquis, rectangularibus; scutello plano, subaequelateraliter triangulari, basi anguste detecto; hemielytris vena clavi duabusque corii elevatis, membrana areolis elongatis, angulo interiore areolae majoris acutiusculo, rotundato; xypho prosterni triangulari, plano, lateribus marginato; mesosterno apicem versus paullo altiore-orificiis metastethii magnis, marginatis; coxis anticis medium mesosterni vix attingentibus; femoribus posticis apicem ab-