

basali circiter $\frac{1}{4}$ brevius, disco laevi, strictura apicali basi articuli secundi antennarum paullo crassiore. Scutellum protoco brevius, sublaeve. Hemielytra abdomen longe superantia, laevia. Tibiae spinulis crassitie tibiae aequa longis.

5. Estuidus Dist.

Rhynch. Notes XXII, Ann. and Mag. Nat. Hist. (7) XIII, 1904, p. 272.

Genus divisionis Capsaria. Membrana a D:o Distant false uniareolata describitur, re vera saltem *E. marginati* Dist. areolis duabus distinctis instructa. Etiam characteres reliqui cum illis divisionis Capsaria m. bene congruunt.

E. marginatus Dist., l. c., p. 273.

Queensland, Townsville, 2 spp., comm. D. Schouteden.

6. Dirhopalia n. g.

Genus divisionis Capsaria m. Corpus ovale, robustum, opaculum, laeve, breviter pubescens; capite nitidulo fere porrecto, pronoto breviore, cum oculis prominentibus apice hujus latiore, a supero viso transverso, ab antico viso latitudine cum oculis parum breviore, a latero viso altitudine basali longiore, vertice immarginato, sulco longitudinali destituto, fronte subhorizontali, clypeo fortiter prominente, basi fere in plano frontis posita a fronte linea transversa impressa bene discreta, loris haud buccatis, genis dimidium altitudinis capitidis occupantibus, gula horizontali, peristomio aequa longo; oculis laevibus, prominentibus, in lateribus capitidis oblique positis; rostro gracili, apicem coxarum intermediarum attingente vel paullo superante, articulo primo medium xyphi prosterni attingente; antennis ad apicem oculorum interne insertis, articulo primo crasso, basi constricto, secundo a medio versus apicem fortiter clavato, ultimis brevibus, gracilioribus; pronoto transverso, trapeziformi, angulis anticis distinctis, obtusis, lateribus levissime sinuatis, margine basali supra scutellum truncato, versus angulos rotundato, disco postico versus apicem modice convexo-declivi, callis obliquis, medio