

Niastama punctaticollis n. sp.

Inferne pallide flavens, dense sangvineo-conspurcata, superne pallide flavens, capite et pronoto nonnihil in sangvineum vergentibus, clypeo, marginibus lorarum superioribus vittaque frontis nec non pronoto postice, marginibus laterilibus exceptis, piceo-nigris; scutello sangvineo, basi nigra, vitta apicali pallide flavente; clavo, margine commissurali apiceque exceptis, corio parte apicali inaequaliter nigro-piceis, corio ultra medium limboque toto exteriore nec non cuneo pallide flaventibus, margine interiore cunei piceo vel sangvineo; membrana pallida, venis sangvineis, areolis limboque exteriore fuscescenti-fumatis; segmento genitali maris angulo superiore sinus sinistri spinula armato. Long. ♂ $6\frac{1}{2}$ mm.

Tasmania, 1 sp.

Caput ab antico visum pronoto circiter $\frac{1}{4}$ brevius. Antennae articulo secundo margini basali pronoti longitudine aequali. Pronotum latitudine basali duplo brevius, apice longitudini fere aequo lato, strictura apicali basi articuli secundi antennarum tenuiore. Scutellum pronoto fere aequo longum. Hemelytra abdomen longe superantia.

9. *Psallus eximius* n. sp.

Aurantiaco-flavus, inferne pallide flavens; capite macula utrinque juxta basin clypei vittaque longitudinali albidis, fronte utrinque striolis verticeque punctis quatuor in arcum antrorsum convexum positis fuscis; pronoto apice atomis fuscis adpersis, disco obscurius aurantiaco, linea tenui media longitudinali albida; scutello albido, solum basi aurantiaco; clavo obscurius aurantiaco, apice late albicante; corio basin versus pallido, maculis nonnullis apiceque late fuscescenti-rubris, margine apicali externe albo; cuneo fuscescenti-rubro, basi late, marginibus angustius apiceque albis; membrana cum areolis sat dilute fumata, venis albis, areola majore apice, minore tota striaque ab angulo interiore apicali areolae majoris in marginem externum ducta obscure fuscis, opacis; an-