

tennis testaceis, articulo primo albo, annulo tenui basali alioque apicali fuscis, pedibus albido-flaventibus, anterioribus inferne seriatim fusco-punctatis, posticis superne oblique nigro-fusco-punctatis, inferne densius nigro-fusco-punctatis, tibiis spinulis nigris e punctis sat magnis nigris nascentibus; tarsis articulo ultimo apice cum ungviculis fuscis. Long. ♀ $3\frac{2}{3}$ mm.

Victoria, 1 sp.

Caput basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$ angustius, ab antico visum latitudine frontis oculique unici parum longius, a latere visum altitudine basali parum longius, vertice oculo duplo latiore, clypeo sat fortiter prominente, angulo faciali acuto. Oculi minute granulati. Rostrum albidum, medium ventris paullo superans, apice nigro-piceo. Antennae articulo secundo margine basali pronoti paullo breviorae. Pronotum latitudine basali fere duplo brevius. Scutellum pronoto aequae longum. Hemielytra feminae abdomen sat longe superantia. Tibiae spinulis crassitiei tibiarum aequae longis. Tarsi articulis duobus ultimis longitudine subaequalibus.

10. *Sthenarus australis* n. sp.

Oblongus, nigricans, superne grisescenti-pubescentis; articulis secundo et tertio rostri pedibusque cum coxis albidis, innotatis, tibiis tenuiter nigro-spinulosis, tarsis nigris; corio circiter tertia basali parte suturaque clavi utrinque sordide albidis, cuneo arcu basali albo, membrana tota nigra. Long. $4\frac{3}{4}$ mm.

Victoria, 1 sp.

Colore signaturisque speciebus quibusdam generis *Psallus* Fieb., Reut. sat similis, differt autem capite a latere viso breviorae, clypeo depresso ne minime quidem prominente, margine verticis tenuiorae, latissime subarcuato, oculis laevibus. Caput ab antico visum latitudine frontis oculique unici paullo brevius, vertice oculo circiter $\frac{2}{3}$ latiore. (Antennae desunt.) Pronotum latitudine basali duplo brevius, disco subhorizontali, postice transversim strigoso, callis haud distinguendis. Hemielytra apicem abdominis modice superantia.