

11. *Campylomma livida* Reut.

Ent. Tidskr. 1884, p. 199.

Pallide ochracea, superne et inferne unicolor, clypeo colore, superne sat longe nigro-pubescentis; antennis articulo primo annulo apicali secundoque basi anguste nigris; femoribus anterioribus puncto anteapicali marginis inferioris, posticis punctis tribus marginis superioris duobusque inferioris nigris, his adhuc inferne apice oblique nigro-punctatis; tibiis spinulis nigris e punctis sat magnis nigris nascentibus; membrana subhyalina, iridescente, venis areolisque pallide flaventibus. Long. ♀ $2\frac{1}{3}$ mm.

Victoria, 1 sp.

C. Nicolasi Reut., speciei palaearticae, simillima, sed laetius ochracea. Caput basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustius, vertice oculo fere $\frac{3}{4}$ latiore. Antennae articulo secundo latitudini capitis (cum oculis) longitudine subaequali. Pronotum latitudine basali magis quam duplo brevius, disco subhorizontali, solum apice leviter declivi. Scutellum pronoto aequae longum. Hemielytra apicem abdominis modice superantia. Tibiae posticae spinulis crassitie tibiae paullulum longioribus.

Verisimiliter femina *C. lividae*, cujus marem l. c. e Bengalia descripsi. Maris vertex oculo solum paullo latior.

12. *Leptidolon* n. g.

Corpus parvulum, oblongum, opacum, superne pallido-pubescentis; capite basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustiore, verticali, ab antico viso transverso, a latere viso altitudine basali distincte brevior, vertice sat lato, fronte perpendiculari, clypeo perpendiculari, nonnihil prominente, basi ejus mox infra medium altitudinis capitis a latere visi posita, angulo faciali recto, gula vix distinguenda; oculis laevibus, in genas sat longe extensis; rostro gracili, apicem coxarum posticarum subattingente, articulo primo caput paullo superante; antennis (♂) ad apicem oculorum interne insertis, articulo primo brevi, apicem capitis parum superante, secundo modice longo,