

lineariter incrassato; pronoto transverso, trapeziformi, apice longitudine vix latiore, basi truncato, disco plano, versus apicem omnium levissime declivi, callis sat distinctis, postice fere in medio impressione transversali terminatis; scutello basi detecto; hemelytris abdomen superantibus, membrana biareolata; alarum areola hamo e vena sustensa emiso, ab origine venae decurrentis paullulum remoto; xyphus prosterni convexo, coxis anticis medium mesosterni longe superantibus, posticis ab epipleuris hemelytrorum longius distantibus; femoribus posticis leviter incrassatis; tibiis spinulis nigris e punctis nigris nascentibus; tarsis posticis articulo tertio secundo aequo longo, aroliis cum ungiculis connatis eorumque medium attingentibus.

Leptidolon vittipenne n. sp.

Fig. 7.

Flavo-virens vel post mortem sat pallide ochraceum, pronoto postice scutelloque, basi excepta, virescentibus; hemelytris ochraceis, dimidio apicali corii vitta longitudinali nigricante signato, membrana fumata, venis ochraceis, areolis totis limboque exteriore, hoc apicem versus angustius, nigricantibus; antennis sordide testaceis, articulis ultimis fuscis; tibiis spinulis nigris e punctis sat minutis nigris nascentibus, articulo ultimo tarsorum nigro-fusco. Long. ♂ 3 mm.

Victoria, 1 sp.

Caput vertice oculo duplo latiore. Antennae articulo secundo margine basali pronoti paullo breviore. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{2}{5}$ brevius. Scutellum pronoto paululum brevius. Tibiae spinulis crassitie tibiarum paullo longioribus.

Explicatio figurarum:

- 1: *Hyaloscytus elegantulus* n. sp. 1 a: caput ab antico, 1 b id. a latere visum, 1 c tarsus posticus.
- 2: *Porphyrodema flavolineatum* n. sp. 2 a: caput a latere visum.
- 3: *Callicratides rama* (Kirby) Dist., caput a latere visum.