

2. *Campylotropis jakovlevi*, n. sp.

Sordida et pallide ochracea, vertice punctis quatuor fusciscentibus, fronte vittis duabus, clypeo apice excepto lorisque nigro-piceis; pronoto basi cuneoque interne et apice fusciscentibus, hoc basi et externe pallido, membranâ fumatâ, venis sordide ochraceis; scutello parte basali aurantiacâ, vittâ ejus mediâ parteque apicali pallide ochraceis; capite apice et lateribus mesosternoque lateribus ferrugineis, propleuris utrinque ante apicem, xypho prostethii mesosterni nigris; antennis pedibusque colore corporis, articulo primo antennarum ferrugineo, vittâ basali inferiore margineque apicali nigris, articulis ultimis fuscis, femoribus punctis nigris biserialim dispositis. Long. ♀ $7\frac{3}{4}$ mm.

Habitat ad flumen Jálu, dom. Vl. Komarov; communic. dom. B. Jakovlev.

Caput a supero visum pronoto fere $\frac{1}{3}$ brevius, vertice feminae oculo circiter duplo latiore. Antennae articulo primo diagonali capitis laterali fere aequo longo, secundo primo circiter triplo longiore. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{2}{3}$ brevius, apice quam basi circiter triplo angustius. Scutellum pronoto paullo brevius. Hemelytra pronoto circiter quadruplo longiora. Tarsi postici tibiâ magis quam quadruplo breviores.