

ctura apicali excepta, longitudine fere duplo latius, inter angulos loborum lateralium strictura apicali circiter quadruplo latius; callis duobus parvis apicalibus pone stricturam lutescentibus. Scutellum pronoto, strictura apicali excepta, aequae longum, medio sulco longitudinali subdistincto. Ungviculi basi dentato-ampliati, aroliis fortiter curvatis, latis, cum dente connexis. Structura et sculptura ceteris cum descriptione *Odoniellae Reuteri* Hagl. (Öfv. Vet. Ak. Förh. 1895, N:o 7, p. 468) congruentia.

### 5. *Pantiliodes Tellinii* n. sp.

Pallide ochraceus, opaculus; fronte utrinque lineis 7 obliquis impressis subferrugineis; antennis articulo primo atomis ferrugineis adperso; pronoto limbo tenui basali ante marginem concolorem maculisque duabus parvulis sat late distantibus mox pone medium disci nigro-fuscis; scutello basi vittulis duabus nigro-fuscis, apice nigro; membrana pallide fumata, venis ferrugineis, area majore parallela, angulo interiore apicali angulato-rotundato; capite a latere viso altitudini basali vix aequae longo, fronte fortiter declivi, gula brevi; pronoto disco postico ruguloso. Long. ♀  $6\frac{1}{2}$  mm.

Abessinia: N. Dongotto, D. Tellini, comm. D. Schoueden.

*P. pallido* (Ramb.) similis, sed signatura pronoti capiteque brevior divergens. Caput basi pronoti circiter  $\frac{3}{7}$  angustius, vertice oculo aequae lato. Oculi fusci. Rostrum apicem coxarum posticarum subattingens. Antennae articulo primo pronoto aequae longo, secundo primo circiter  $2\frac{1}{3}$  longiore, tertio secundo circiter  $\frac{1}{6}$  brevior. Pronotum latitudine basali paullo magis quam  $\frac{1}{3}$  brevius.

### 6. *Pleurochilophorus* nov. gen.

Corpus oblongum, nitidum, superne subglabrum et sublaeve, pube aurea faciliter divellenda destitutum; capite ver-