

Erythraea: ad Ghinda! in regione silvestri d. 7 et 8 februarii; Massauah!, D. Dr Levander (Mus. Helsingf.); Assetch!, D. Tellini, comm. D. Schouteden.

Caput pronoto aequae longum vel (σ) fere paullo longius, latitudine cum oculis fere dimidio longius, a latere visum altitudinem latitudine clypei superans, vertice oculo circiter duplo (σ ♀) latiore. Antennae articulo primo capite ab antico viso circiter $\frac{1}{4}$ (σ ♀) brevior, secundo primo circiter triplo et margine basali pronoti circiter dimidio longior, tertio secundo circiter $\frac{1}{4}$ —paullulum, quarto tertio circiter $\frac{1}{3}$ brevior. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{2}{3}$ brevius, basi quam apice duplo (σ) vel magis quam duplo (♀) latius. Scutellum pronoto aequae longum. Tibiae spinulis concoloribus crassitiei tibiae fere aequae longis.

8. *Charitocoris sanguineonotatus* n. sp.

Pallide albedo-stramineus, superne subtiliter flavicanti-pubescens, oculis nigris, rostro apice nigro; pronoto limbo basali, clavo ante medium corioque fascia vel macula magna apicali nec non femoribus posticis apicem versus sanguineo-conspurcatis, tibiis tenuiter nigro-spinulosis, tarsis totis nigris; vertice oculo paullo angustiore (σ) vel paullo latiore (♀); segmento maris genitali mutico, basi leviter sanguineo-consperso. Long. σ $4\frac{3}{4}$, ♀ $5\frac{2}{3}$ mm.

Somalis, 1 σ , 2 ♀♀, comm. D. Schouteden.

Species notis plurimis characteristicis cum genere *Charitocoris* Reut. (Caps. persic., in Ann. Mus. Zool. de l'Ac. Sciences St. Petersb. T. IX (1904), p. 10) congruit, differt solum antennis ad marginem oculorum interiorem paullo altius positae stricturaque apicali pronoti paullo tenuiore. Corpus oblongum, pallide pubescens, superne sublaeve. Caput fortiter nutans, basi pronoti circiter $\frac{2}{3}$, angustius, ab antico visum fortiter (σ) vel sat leviter (♀) transversum, a latere visum altitudini fere aequae longum, vertice immarginato, sulco destituto, clypeo prominente, verticali, basi a fronte sat discreto, ipsa basi in medio altitudinis capitis posita, loris haud buccatis, genis humilibus (♀) vel humillimis (σ), gula brevi,