

Abessinia: Adi Agri!, comm. D. Schouteden.

*St. binotato* (Fabr.) sat similis, sed minor et gracilior, aliter pictus, pronoto solum vitta media margineque laterali medio flavis, corio postice usque in marginem lateralem piceo, capite rostroque brevioribus divergens. Caput vertice ( $\sigma$ ) oculo fere aequo lato, angulo faciali acutiusculo. Antennae mox infra medium orbitae interioris in sinu oculorum insertae (articuli desunt). Pronotum latitudine basali circiter  $\frac{1}{5}$  brevius, apice quam basi circiter duplo angustius, disco sat fortiter declivi, subtiliter punctulato. Scutellum sublaeve. Hemelytra abdomen modice superantia, membrana sat leviter fumata, venis rufo-piceis. Tibiae anticae solum postice tenuiter spinulosae, intermediae sat longe piceo-spinulosae (posticae desunt). Tarsi intermedii (postici desunt) articulo primo secundo magis quam duplo longiore.

## 12. *Stenotus longipennis* n. sp.

Elongatus, sordide flavens, sat nitidus, superne tenuiter pallido-pubescens, oculis antennisque fusco-nigris, his maris fere ad medium orbitae interioris in sinu oculorum insertis, articulo primo diagonali laterali capitis saltem aequo longo; vertice utrinque ad oculum stria introrsum curvata, fronte utrinque striolis 6—7, clypeo lorisque, pronoto callis vittisque quatuor retrorsum divergentibus, intermediis latius distantibus, scutello punctis duobus basalibus, epipleuris pronoti vittis duabus, mesosterno, mesopleuris vitta obliqua, metapleuris, ventre utrinque vitta laterali segmentoque maris inferne piceis; hemelytris abdomen longe superantibus, pronoto fere quadruplo longioribus, dilute fusciscentibus, lateribus commissuraque, hac anguste, flaventibus, cuneo subsanguineo, limbo exteriori pallide flavente, membrana sat dilute fumata, venis subsanguineis, brachiali sordide flavente; capite maris ab antico viso latitudini cum oculis longitudine subaequali, a latere viso fere aequo longo ac alto, clypeo usque a basi fortiter prominente, basi a fronte bene discreto, gula dimidium capitis occupante; pronoto fortiter transversim rugoso et punctato; rostro apicem coxarum posticarum attingente,