

gitudinalibus, cuneo margine interiore apicem versus, mesosterno, mesopleuris vitta obliqua, ventre vittis duabus lateralibus, exteriori postice abbreviata, tarsis articulo ultimo apice nigris vel nigro-piceis; membrana hyalina, areola majore interne et apice nigro-variegato, minore nigra, vittula arcuata inter apicem areolae minoris et apicem cunei, vitta arcuata ab apice areolae majoris ad medium marginem exterioris ducta ibique dilatata, nec non arcibus duobus disoidalibus venae brachiali parallelis nigris, posteriore sat obsoleto; antennis articulo secundo margine basali paullulum longiore, ultimis pallidis; tibiis pallido-spinulosis, punctis destitutis. Long. ♀ $5\frac{2}{3}$ mm.

Abessiniam: Asmara Cheren!, D. Tellini, comm. D. Schouteden.

Species signaturis nigro-piceis, articulis ultimis antennarum pallidis, tibiis pallido-spinulosis distincta. Caput basi pronoti duplo angustius, ab antico visum latitudini frontis oculique unici aequae latum, a latere visum altitudine basali circiter $\frac{1}{3}$ brevius, vertice tenuissime marginato, sulco medio longitudinali impresso. Antennae articulo primo capite paullo brevior, secundo primo circiter triplo longior, tertio secundo circiter $\frac{2}{5}$ brevior. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{2}{5}$ brevius, apice quam basi circiter $\frac{3}{5}$ angustius, strictura annuliformi apicali apici articuli secundi antennarum aequae crassa, disco apicem versus sat convexo-declivi, callis parvulis. Hemielytra abdomen sat longe superantia. Tibiae ipso apice infuscato, anticae solum interne tenuiter spinulosae, intermediae triseriatim spinulosae. (Pedes postici desunt.)

15. *Lygus Alluaudi* n. sp.

Olivaceo-testaceus, ipso apice clypei oculisque nigris; scutello basi lateribusque fusciscenti-lurido, medio apiceque flavescente; hemielytris fusciscenti-luridis, clavo limbo scutellari commissuraque, sutura clavi, corio vena cubitali, vitta ejus dilatata apicali margineque exteriori, cuneo angulo interiore late apicali aequae angustius nigro-piceis, membrana fusca, venis nigro-piceis, cuneo medio pallide flavente; femoribus po-