

22. *Deraeocoris pallidipennis* n. sp.

Niger, nitidus, glaber, stria verticis marginali margineque basali pronoti tenuiter luteis; scutello rufo-testaceo, saepe vitta media lutea, hemielytris sat obscure testaceis, remote nigro-punctatis, clavo toto (♀) vel solum limbo scutellari commissuraque, corio plaga dimidii apicalis, embolio apice cuneoque apice late nigris, membrana nigricante, venis nigris, areolis maculaque sat magna infra apicem cunei hyalinis, interdum dimidio basali hyalino; tibiis annulis duobus albidis, altera angustiore in parte quarta basali posito, altero latiore infra medium; ventre maris testaceo, apice nigro. Long. ♂ $6\frac{1}{3}$, ♀ $4\frac{3}{4}$ mm.

Abessinia: Adi Carè!, comm. D. Schouteden.

An varietas *D. tibialis* Reut., sed major, oculis maris paullo minoribus. A *D. scutellari* (Fabr.) corpore graciliore, scutello rufotestaceo nec rubro, colore hemielytrorum, vertice maris angustiore hemielysrisque maris remotius et subtilius punctatis distinguendus. Caput basi pronoti paullo minus quam duplo angustius, ab antico visum latitudine frontis oculique unci longitudine subaequalè (♀) vel hac distincte brevius (♂), vertice oculo paullulum (♂) vel fere dimidio (♀) latiore. Antennae nigrae, articulo secundo (♂) latitudini basali pronoti aequae iongo, versus apicem leviter incrassato. Pronotum latitudine postica circiter $\frac{1}{3}$ brevius, apice quam basi triplo (♂) vel fere triplo (♀) angustius, disco sat convexo, fortiter sed modice dense punctato. Scutellum laeve. Hemielytra remote punctata, cuneo sublaevi. Area orificiorum metastethii alba. Pedes glabri. Ungviculi fortiter curvati, basi dentati.

23. *Trichophorella* nov. gen.

Corpus subelongatum, leviter nitidum, superne setis sat longis erectis instructum, capite a supero viso pronoto brevior et latitudine hujus circiter $\frac{2}{5}$ angustiore, antice rotun-