

Histriocoris incomparabilis (Stål).

Superne niger, capite, apice pronoti, scutello, puncto medio basali excepto, cuneoque flavo-testaceis vel lutescentibus, hoc angulo interiore et $\frac{2}{5}$ apicalibus nigris; pronoto pone fasciam callosam antepicalem vittis tribus postice latioribus et in marginem basalem productis corioque maculis duabus flavo-albidis, altera ante medium posita, suturam clavi haud tamen marginem exteriorem attingente, apice truncata, altera in angulo interiore posita, externe recte truncata; inferne flavo-testaceus, disco mesosterni, apice maculisque lateralibus ventris nigris, his in seriem positis; antennis nigris, articulo primo apice excepto lutescente vel flavo-testaceo, tertio et quarto basi albidis; femoribus cum coxis lutescentibus, illis basi apiceque nigris, tibiis tarsisque nigris, illis infra medium annulo lato albido-flavente. Long. ♂ 6, lat. 3 mm.

Capsus incomparabilis Stål, Öfv. Vet. Ak. Förh. 1855, p. 35, 5. *Deraeocoris* id. Stål, Hem. Afr. III, p. 22, 3.

Caffraria, D. J. Wahlberg.

Caput ab antico visum pronoto circiter $\frac{1}{3}$ brevius, vertice (♀) oculo circiter dimidio latiore. Antennae articulo primo apicem capitis paullo superante, secundo primo vix duplo longiore et margine basali pronoti fere duplo brevior. Pronotum apice quam basi circiter $\frac{3}{5}$ angustius, lateribus rectis, margine postico latissime rotundato, disco minus dense parum profunde punctato. Scutellum convexiusculum. Hemelytra subtilissime sat dense punctulata, leviter nitidula; membrana cum venis et areolis nigricante.

Camptobrochis ostentans (Stål).

Varicolor, nitidus, glaber; pronoto hemelytrisque remote minus fortiter punctatis; capite nigro, vittula media frontis striaque transversali verticis albis; macula parva media inter callos pronoti margineque ejus basali latera versus albis, margine acetabulorum anticorum areaque odorifica metastethii albis; scutello flavo-testaceo, angulis basalibus nigris; mem-