

Capsidae novae mediterraneae

descriptae

ab

O. M. REUTER.

V.

Species a dominis J. et U. Sahlberg in itinere
a. 1903—1904 collectae.

1. *Phytocoris extensus* Reut.

Pallide virescens, superne flavo-pubescens, capite, pronoto scutelloque vitta media percurrente in pronoto dilatata discoque pronoti utrinque pone callum vitta niveis; hemielytris longis, pallidissime flavo-virentibus, sutura clavi utrinque vittaque corii apicali intra venam cubitalem dilute infuscatis, cuneo margine interiore apicem versus dilute chermesino, membrana albida, venis omnibus pallidis, ad partem interne nigricanti-marginatis, limbo exteriori macula paullo infra basin, vitta ab apice areolae majoris usque ad apicem ducta ibique valde dilatata limboque interiore late nigricanti-conspersis; capite a supero viso aequae longo ac lato, a latere viso altitudine paullo longiore, fronte in plano capitis subhorizontali, clypeo usque a basi fortiter prominente, vertice oculo fere duplo latiore (σ^7), antennis articulo primo longo, sat leviter incrassato et sublineari, pronoto capitique usque ad apicem frontis aequalongo, pilis rigidis crassitie articuli brevioribus, obsolete albido-guttulato; pedibus longis, femoribus apicem versus dense fuscescenti-conspurcatis, posticis inferne anguste dilute chermesinis, tibiis totis innotatis, spi-