

6. *Caloceris rubicundus* Reut.

Oblongo-ovalis, rufescenti-aurantiacus, sat nitidus, superne pilis nigris adpressis parce pubescens, pubescentia pallida destitutus; antennis articulo primo pedibusque breviter nigro-pubescentibus, illis articulo secundo apice nigro, ultimis simul suntis secundo paullo longioribus fuscis, tertio basin versus pallido, tibiis pallide flaventibus, nigro-spinulosis; corio apicem versus cuneoque coccineis, membrana sat dilute fumata, venis coccineis; capite nutante, a latere viso altitudini basali aequae longo, angulo faciali acuto. Long. ♀ 8 mm.

Asia minor (Bulghar-Dagh, Turuntschli! d. 24 aprilis), D. U. Sahlberg.

C. affini (H. Sch.) proximus videtur, sed colore etc. ab omnibus distinctissimus. Caput basi pronoti duplo angustius, setis nonnullis nigris instructum, ab antico visum latitudini cum oculis aequae longum, vertice (♀) oculo paullo minus quam duplo latiore, a latere visum clypeo cum fronte subconfluente, genis humilibus, gula peristomio aequae longa. Oculi nigri, in genas sat longe extensi et valde oblique positi, orbita interiore apicem versus sinuati. Rostrum apicem coxarum intermediarum attingens, ipso apice nigro. Antennae paullo supra apicem oculorum interne insertae, articulo primo aurantiaco-rufo, capite ab antico viso paullo brevior, secundo primo fere $2\frac{1}{3}$ et margine basali pronoti parum longiore, pallidius flavente, circiter $\frac{1}{6}$ apicali nigro, duobus ultimis secundo gracilioribus, tertio secundo circiter $\frac{2}{5}$ brevior, quarto tertio aequae longo; tribus ultimis tenuissime pallido-pubescentibus, primo pilis nigris adpressis. Pronotum latitudine basali parum magis quam $\frac{1}{3}$ brevius, apice quam basi duplo angustiore, strictura apicali articulo primo antenarum circiter $\frac{1}{3}$ angustiore, setis nonnullis nigris instructa, callis sat discretis antice conjunctis, disco postico apicem versus sat convexo-declivi, lateribus sub-rectis, limbo basali basin scutelli obtegente. Scutellum parum convexum, subtilissime transversim strigulosum. Hemielytra crebre subtiliter punctulata, corio externe cuneoque laevibus. Pectus aurantiaco-rufescens, orificiis metastethii albidis. Venter auran-