

Appartient, avec les deux espèces ci-dessus, au sous-genre *Ultiole-mur* Thoms., caractérisé par l'appendice prosternal bicorné.

Vit sur un *Ficus* très commun aux Comores, appelé par les indigènes « Mouhy », à la Grande Comore, et « Mhouyou », à Anjouan et à Mohéli. D'après M. P u p i e r, on découvre difficilement l'insecte sur l'arbre, mais, dès qu'on l'abat et qu'on tronçonne les grosses branches, il y vient se poser. Ce *Ficus* coupé répand une odeur très forte, en même temps qu'une sève rouge-brun se dégage des meurtrissures et se fige en gomme.

Il est probable que la femelle vient pondre dans la moelle mise à jour, à la façon de l'*Oncideres amputator* Fab., qui coupe lui-même les branches du Pois doux, à la Guadeloupe.

Trois Capsides nouveaux pour la faune française [HÉM.]

par O.-M. REUTER.

En examinant une collection de Capsides appartenant au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, j'en ai trouvé trois non encore signalés de France :

1. **STRONGYLOCORIS OBSCURUS** Ramb. var. **Oberthuri**, nov. — *Inferne nigro-piceus, superne capite, pronoto, macula basali triangulari scutelli, clavo fere toto, corio membranaque fusco-nigris; vertice marginé basali medio angustius, lateribus late, pronoto limbo laterali utrinque, interdum etiam macula indeterminata discoidali, corio basi limboque ad suturam clavi latius, limbo laterali exterioré angustius venisque membranae grisescenti-luridis; membrana macula pallida ad apicem cunei; antennis rostroque totis nigris; pedibus nigrescenti-luridis, femoribus basi nigro-piceis, tarsis nigris* ♀.

Pyrénées-Orientales : Vernet-les-Bains. — Trois ex. trouvés, avec le type, par M. R. Oberthür.

2. **PACHYXYPHUS CAESAREUS** Reut. — Pyrénées-Orientales : Vernet-les-Bains (M. R. Oberthür). Espèce connue seulement d'Espagne et de Portugal.

3. **Chlamydatus longirostris**, n. sp. — *Sut breviter ovalis, antennis pedibusque flavicanti-albidis, illis maris et feminae articulo primo fereque dimidio basali secundi necnon coxis et femoribus posticis nigris, apice femorum posticorum anguste flavicanti-albido, tibiis*

nigro-spinulosis, anterioribus spinulis e punctis minutis, posticis spinulis e punctis sat magnis nascentibus, tarsis articulo ultimo fuscescente, unguiculis nigris; capite basi pronoti paulo magis quam $1/5$ angustiore, vertice tenuiter marginato oculo circiter $2/3$ latiore, fronte subdeplanata, clypeo levissime prominente; rostro medium ventris attingente, nigro-piceo, articulis secundo et tertio pallide flaventibus, primo apicem xyphi prosterni superante; antennis articulo secundo latitudine capitis circiter $1/4$ brevior, tertio secundo circiter $1/5$, quarto tertio fere $1/3$ brevior; pronoto latitudine basali duplo brevior; membrana nigricante, sutura ad apicem cunei tenuiter hyalina et Chl. pulicario Fall., fronte haud convexa, rostro longo, articulo secundo antennarum etiam maris dimidio apicali flavente coxisque anterioribus totis flavo-albidis divergens. — Long. : $1 \frac{4}{5}$ - 2 mill.

Hérault : Palavas. — Quatre ex. trouvés par Maurice Noualhier.

Sur quelques Hyménoptères d'Amérique

par R. DU BUYSSON.

POLYBIA RUFICEPS Schrottky. — Cette jolie Guêpe a été reprise par M. E.-R. Wagner dans la République Argentine, Chaco de Santiago del Estero, sur les bords du Rio Salado, à La Palisa, 25 kilomètres d'Icaño. (Muséum d'Histoire naturelle de Paris, 1904.)

P. OCCIDENTALIS Oliv. var. **diguetana**, nov. — M. L. Diguët a rapporté des environs d'Oaxaca (Mexique) une variété noire de la *P. occidentalis* Oliv. Elle diffère du type par sa taille plus grêle, son coloris entièrement noir ou bien avec une légère marge blanchâtre sur le bord postérieur du 1^{er} tergite abdominal. La ponctuation thoracique est à peine visible, le thorax est plus étroit et l'abdomen plus allongé. — La longueur est la même. ♀♂.

La nidification est semblable à celle, bien connue, du type.

P. OCCIDENTALIS Oliv. var. **nigratella**, nov. — Cette variété se distingue de la précédente par la forme robuste et large du thorax et de l'abdomen. Elle est entièrement noire, et la ponctuation thoracique est très distincte. — ♀♀. Même longueur que le type.

Mexique : environs d'Oaxaca (L. Diguët, 1903, Muséum de Paris).