

Carácas d. 22 julii, unicum specimen.

Caput basi pronoti vix magis quam $\frac{1}{6}$ angustius, verticale, ab antico visum latitudine frontis parum longius, vertice oculo circiter triplo lato, a latere visum altitudine multo brevius, fronte sat convexa, clypeo leviter prominente, genis oculis aequve altis. Oculi laeves, exserti, leviter retrorsum vergentes, a latere visi leviter oblongi. Antennae articulo primo linearis, latitudine vetricis circiter $\frac{1}{3}$ breviore, secundo primo paullo longiore, ultimis gracilibus, simul sumtis primis aequve longis. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{3}{4}$, brevius, creberrime tenuissime punctulatum, pubescens, lateribus medio late sinuatis. Hemielytra crebre subtiliter punctulata, lateribus sensim sat ampliata, medio basi pronoti distincte latiora. Pedes breviusculi. Tibiae omnium brevissime pubescentes, muticae.

3. Pycnoderes incurvus (Dist.). *Eccritotarsus* id. Dist., Biol. Centr.-am. p. 285, 8, T. XXVI, f. 19.

Los Trincheres, duo specimina.

Distr. geogr.: Mexico, Guatemala.

Haec species a *P. quadrimaculato* Guér. e Cuba, cuius specimen typicum in Museo Vindobonensi asservatur, tuberis pronoti sat multo altioribus divergit.

4. Pycnoderes (Arsinotus) albicornis n. sp. (Fig. 2).

Niger, nitidus, hemielytris opacis; antennis totis, rostro, pedibus cum coxis, limbo cerii lateralii dilatato (embolio) ultra medium guttaque ejus anteapicali nec non cuneo, angulo inferiore excepto, albis. Long. $2\frac{1}{2}$ mm.

La Moka, duo specimina.

Species parva, sed scitula. Caput basi pronotum circiter $\frac{3}{5}$ angustius, ab antico visum latitudine cum oculis fere paullo longius, infra oculos longe rostrato-productum, vertice oculo circiter duplo lato; a latere visum altitudine fere duplo brevius, verticale, fronte sat convexa, subtiliter punctata, foveola medio destituta, clypeo sat prominente, leviter arcuato, basi a fronte incisura discreto, angulo faciali recto, genis oculis aequve altis, gula brevi, erecta. Oculi fusci vel albidi. Antennae