

oblique antrorsum vergente, subrecto vel ante angulos omnium levissime sinuato; scutello punctato; hemielytris sat remote punctatis, medio pronoto latioribus, corio margine laterali apicem versus magis minusve dilatato, vena cubitali convexa, a medio obsoleta, cuneo latitudini basali aequae longo, membrana biareolata; mesosterno brevi; orificiis metastethii distinctis; pedibus breviusculis, tibiis pilosulis, muticis, tarsis brevibus, articulis duobus primis longitudine subaequalibus, tertio his simul sumtis paullo brevioribus, apicem versus distincte incrassato, ungviculis a basi maxime divaricatis, apice uncinatis, aroliis valde divaricatis, acuminatis et apicem ungviculorum subattingentibus. Hoc genus membrana biareolata praeditum tamen structura tarsorum et ungviculorum generibus hujus divisionis maxime affine videtur.

Monalocorisca chrysodasia n. sp.

Pallide albido-ochracea, dum vivit forsitan nonnihil virens, pronoto, scutello hemielytrisque pilis brevibus rigidulis aureis pubescentibus, his pilis e punctis fortius impressis sed sat minutis nascentibus; pronoto et scutello rugulosis, densius punctatis, hemielytris remotius punctatis; antennis apice articuli secundi articulisque ultimis, nec non articulo ultimo tarsorum fuscis, femoribus apice leviter infuscatis. Long. 4 mm.

Carácas d. 22 julii, unicum specimen.

Corpus sat late ovale. Caput a superno visum pronoto multo brevius, ab antico visum sat leviter transversum, vertice omnium tenuissime carinato, fronte utrinque oblique impresso-strigosa. Oculi orbita interiore apicem versus fortiter divergentes et leviter sinuati. Antennae articulo primo secundo crassiore, capite ab antico viso duplo brevioribus, secundo hoc circiter triplo longioribus, sat gracilibus, versus apicem sensim leviter incrassato, tertio secundo fere duplo brevioribus et quarto longioribus. Pronotum latum, sed latitudine postica vix magis quam $\frac{1}{4}$ brevius, apice quam basi paullo minus quam triplo angustius, strictura apicali crassitie apicali articuli secundi antenarum paullo crassiore, callis sat magnis, subquadratis, convexis, leviter oblique positis, medio sat distantibus et lateribus a