

tris attingens. Pedes longi, graciles, femoribus linearibus, pilis longis nigris pilosis, tibiis dense nigro-pubescentibus, ultra medium longe nigro-pilosis, tarsis inferne dense cinereo-tomentosis, articulo secundo primo fere triplo brevior.

Distr. geogr.: Venezuela (La Guayra).

Obs. Haec species ut species hujus divisionis nec div. *Miraria* censenda est, generi *Platytylo* Fieb. (*Callichilo* Reut.) sat affinis. A divisione *Miraria* m. divergit corpore ovali, capite verticali, strictura apicali annuliformi pronoti tota discreta. Linea impressa longitudinalis verticis sat obsoleta.

11. *Resthenia montivaga* Dist., Biol. Centr.-amer., p. 256, 20.

Varietas (sec. Champ. in litt.):

Superne nigra, opaca, subalutacea; pronoto utrinque pone callos macula sat obsoleta laterali ochracea; antennis nigris, articulis secundo et tertio basi anguste ochraceis; pectore ochraceo, mesosterno nigricante; ventre sanguineo, lateribus apiceque sordide ochraceo; pedibus cum coxis nigricantibus, femoribus posticis dimidio basali sordide ochraceis. Long. ♀ 7 $\frac{1}{2}$ mm.

Las Adjuntas, unicum specimen.

Distr. geogr. speciei: Panama.

A typo pronoto utrinque ochraceo-maculato divergens. Rostrum apicem coxarum intermediarum vix superans, nigricans, articulis duobus primis longe griseo-pilosis. Antennae articulo primo capituli longitudine, secundo primo fere triplo et margine basali pronoti circiter $\frac{1}{3}$ longiore. Pronotum basi longitudine vix latius, lateribus late sinuatis. Hemielytra basi pronoti aequae lata, parallela, maringe laterali tenuissime pubescente. Pedes nigro-pilosi, pilis retrorsum vergentibus. Tarsi postici margine inferiore articuli secundi eodem primi duplo brevior

12. *Resthenia Meinerti* n. sp.

Superne nigra, opaca, glabra, pronoto rufescenti-ochraceo, strictura apicali medio, callis vittaque lata media usque in margi-