

ungviculis mox infra basin angulariter antrorsum curvatis, dein tenuissimis, aroliis haud distingvendis. Venter feminae convexus, terebra longa.

Generi *Antias* Dist. similis videtur, oculis ab apice pronoti distincte remotis, pronoto basi quam apice fere triplo latiore divergens.

Parantias tennicornis n. sp. (Fig. 14).

Pallide flavo-ochraceus, capite callisque pronoti saturatius ochraceis; antennis quarta parte apicali incrassata articuli secundi articulisque ultimis, basi tertii excepta, macula angulorum posticorum pronoti, scutello, clavo fasciaque lata apicali corii utrinque lateribus attenuata et ad limbum explanatum abrupta, fere dimidio basali membranae, pectore ventrequae nigro-piceis, clavo medio late pallido-flavente; orificiis metastethii pallide flaventibus; tarsis apice articuli ultimi fusco. Long. ♀ $3\frac{3}{4}$ mm.

Caracas d. 22 julii unicum specimen.

Caput (♀) vertice fere $2\frac{1}{2}$ latiore. Antennae articulo secundo basi pronoti parum longiore. Hemielytra apicem abdominis sat longe superantia, membrana albido-hyalina, fere dimidio basali cum areolis nigro-picea, vena connectente pallide flavente.

Div. Cyllocoraria Reut.

28. *Schistonotellus* nov. nom. — *Schizonotus* Reut., Ann. Soc. Ent. Fr. 1892, p. 401 (nomen praeoccupatum). — (Fig. 15).

Schistonotellus dromedarius Reut. l. c., p. 402, 16. (*Schizonotus*).

29. *Falconiodes* nov. gen. (Fig. 16).

Corpus elongatum, tenuissime pubescens. Caput basi pronoti vix magis quam $\frac{1}{4}$ angustius, verticale, a supero visum