

34. *Sthenarus clavicornis* n. sp.

Niger vel piceo-niger, superne squamulis aureis facile divellendis sat dense vestitus; antennis pallide flavis, articulo primo nigro, secundo latitudini verticis oculique unici longitudine subaequali, a medio versus apicem clavato-incrassato apiceque primo parum crassiore, circiter $\frac{2}{5}$, apicalibus nigris, ultimis gracilibus; femoribus totis piceo-nigris, solum anticis apice anguste pallide flavis; tibiis flavis, nigro-spinulosis, anterioribus innotatis, posticis punctis parvis nigris ad bases spinularum dimidioque basali nigro-piceo, tarsis pallide flavis, extremo apice fuscescente. Long. ♀ 2 mm.

La Moka m. augusti, unicum specimen.

Corpus oblongum. Caput (♀) breve, transversum, basi pronoti fere $\frac{2}{5}$ angustius, vertice margine tenui pallidulo oculo circiter dimidio latiore. Rostrum apicem coxarum posticarum attingens, testaceum, articulo primo nigro-piceo, caput parum superante. Pronotum basi longitudine fere duplo et dimidio latius, apice capite parum angustius, disco laevi. Scutellum et hemielytra laevia, membrana nigricante.

Explicatio tabulae.

Fig. 1 a: *Eurycipitia splendens* Dist., var *signaticollis* m. Caput et apex pronoti ab antico visa; 1 b: id. a latere.

Fig. 2: *Pycnoderes albicornis* n. sp. caput, pronotum et scutellum a latere visa.

Fig. 3 a: *Neofurius variabilis* Dist. (var.) a supero visus; 3 b: caput, pronotum et scutellum a latere visa.

Fig. 4: *Monalocorisca nebulosa* n. sp., caput et pronotum ab antico visa.

Fig. 5: *Lygdus Signoreti* Dist., caput, pronotum et scutellum a supero visa; 5 b: caput apexque pronoti a latere visa.

Fig. 6: *Resthenia (Prepops) frontalis* n. sp., caput apexque pronoti a latere visa.

Fig. 7: *Lampethusa anatina* Dist., caput apexque pronoti a latere visa.