

T. contracto, *H.-Sch.*, minor, colore corporis, antennarum et pedum, pronoto magis æquali, lobo antico ejus parum convexo, sulco transversali minus distincto, spinula posteriore femorum anticorum basi magis appropinquata mox distincta. Caput omnium creberrime et subtilissime punctatum. Antennæ articulo secundo latitudini verticis oculique unici æque longo, ultimis apice ejus paullo crassioribus, tertio secundo circiter $\frac{1}{2}$ brevior, quarto secundo fere æque longo. Rostrum pallide flavens, coxas intermedias attingens. Pronotum sulco transversali pone medium sito, parte apicali parum convexo, creberrime subtiliter punctata, parte basali concolore, minus crebre et paullo fortius punctata. Scutellum ut pars basalis pronoti punctatum. Clavus triseriatim punctatum. Corium apicem versus obsoletius punctatum.

Two specimens.

Pachytomella cursitans, n. sp.

Nigra, nitens, pronoto postice hemielytrisque omnium subtilissime cinereo-pubescentibus; antennis pedibusque utriusque sexus totis nigris; vertice haud vel obsoletissime marginato et utrinque ad oculum obtuse depresso, fronte fortiter convexa, clypeo basi a fronte impressione bene discreto; antennis articulo secundo latitudine verticis interoculari parum longiore (σ) vel hac circiter $\frac{1}{3}$ brevior, gracili (ρ); hemielytris crebre sat fortiter coriaceo-punctulatis; mare feminaque (plerumque) brachypteris; capite formæ brachypteræ basi pronoti æque lato; dorso abdominis feminae leviter ænescente.

Long. σ $1\frac{1}{2}$ mm, ρ $1\frac{3}{4}$ mm.

Hab. CANTABRIAN MOUNTAINS, Puerto de Pajares.

P. doriae, *Ferr. et Reut.*, affinis et similis, corpore superne niger-rimo haud chalybeo-nitente, quamvis valde nitido, glabro, solum pronoto postice hemielytrisque omnium brevissime et subtilissime cinereo-pubescentibus, his fortius coriaceo-punctatis, antennis brevioribus pedibusque utriusque sexus totis nigris divergens. Corpus formæ brachypteræ breviter ovale (σ) vel late ovatum (ρ). Caput formæ brachypteræ a supero visum pronoto longitudine æquale vel subæquale, ab antico visum latitudini verticis oculique unici fere æque longum, vertice oculo fere $2\frac{1}{2}$ (σ)—triplo (ρ) latiore, clypeo retrorsum vergente, genis altis, gula haud distinguenda. Oculi retrorsum vergentes, angulis anticis pronoti incumbentes. Antennæ ad (σ) vel paullo infra (ρ) apicem oculorum interne insertæ, articulo primo apicem clypei haud attingente, secundo versus apicem sensim incrassato, feminae quam maris