

leviter infuscato. Hemielytra abdomen modice superantia; membrana angulo interiore apicali areolae majoris obtuse angulato. Segmentum maris genitale ad medium marginis anterioris sinus sinistri aperturae tuberculo prominente instructum.

## 6. *Calocoris Braunsi* n. sp.

Sordide lividus, nitidus, articulo primo antennarum femoribusque posticis apicem versus ferrugineis, pectore ventreque picescentibus, areis orificiorum pallidis; hemielytris obscure piceis, nitidis, crebre sat subtiliter punctatis, dense subtiliter pallido-pubescentibus, corio basin versus limboque exteriore pallidis, cuneo livido, membrana cum venis fusca; antennis articulo secundo apice sat late ultimisque nigris, tertio basi pallido, secundo margine basali pronoti vix longiore; rostro apicem coxarum posticarum attingente; tibiis spinulis concoloribus, crassitiei tibiae aequalongis. ♂. Long.  $6\frac{3}{4}$ , lat.  $2\frac{1}{3}$  mm.

Terra Capensis: Algoa Bay, D. Brauns (Mus. Vindob.).

Caput basi pronoti circiter duplo angustius, a latere visum altitudine fere paullulum brevius, vertice (♂) oculo circiter  $\frac{2}{5}$  latiore, sulco longitudinali instructo, clypeo sat leviter prominente, angulo faciali subrecto, gula sat longa. Rostrum articulo primo medium xyphi prosterni attingente. Antennae articulo primo capiti ab antico viso longitudine subaequali, secundo primo paullo magis quam duplo longiore, duobus ultimis gracilioribus, tertio secundo paullo magis quam  $\frac{1}{3}$  brevior. Pronotum latitudine basali circiter  $\frac{2}{3}$  brevius, strictura apicali articulo primo antennarum aequae crassa, disco postico apicem versus sat convexo-declivi, sat grosse sed parum profunde punctato. Scutellum tenuiter transversim strigosum. Hemielytra (♂) abdomen modice superantia. Segmentum maris genitale ad sinum sinistrum aperturae muticum. Pedes subglabri.