

## Stenotus Jak.

Reut., Hem. Gymn. Eur. V, p. 122, XX, T. I, fig. 20.  
*Koraciocapsus* Kirk., Trans. Ent. Soc. Lond. 1902, II, p. 260.

Speciebus pluribus cognitis, diagnosis nonnihil modi-  
 fienda est. Caput ab antico visum saepe magis minusve, in-  
 terdum fortiter transversum, a latere visum altitudini vix  
 aequae longum vel huic longitudine aequale, fronte sat de-  
 clivi, gula brevi. Rostrum saepe brevius, coxas intermedias  
 haud superans. Antennae maris interdum ad medium margi-  
 nis interioris oculorum insertae, articulo primo longitudine  
 nonnihil variante. Genus hocce a reliquis ejusdem divisio-  
 nis vertice immarginato praeditis corpore subelongato vel sub-  
 elongato-ovali articuloque primo tarsorum posticorum secundo  
 haud crassiore, hoc illo saltem  $\frac{1}{3}$  vel duplo vel magis quam  
 duplo brevior, duobus ultimis simul sumtis primo paullo  
 longioribus vel huic aequae longis, antennis sat longis, arti-  
 culis linearibus nec non orificiis metastethii rimam trans-  
 versalem marginatam formantibus a reliquis optime distin-  
 guendum.

### 9. *Stenotus vitticollis* n. sp

Oblongus, stramineus, clypeo, oculis, articulo saltem primo  
 antennarum (ultimi desunt), pronoto vittis quatuor retrorsum  
 divergentibus, antice utrinque in callo geminatim conjunctis,  
 mediis distantibus, marginibus lateralibus scutelli, corio vitta  
 suturam clavi terminante, disco pectoris, ventre vitta media  
 aliaque utrinque laterali, tibiis apice anguste tarsisque totis  
 nigris; corio intra venam cubitalem cuneoque castaneis vel  
 rufo-ferrugineis; femoribus posticis ferrugineo-tinctis; capite  
 ab antico viso fortiter ( $\sigma$ ) vel leviter ( $\varphi$ ) transverso, a la-  
 tere viso altitudine basali paullo brevior, vertice oculo  
 circiter  $\frac{1}{4}$  angustiore ( $\sigma$ ) vel hoc fere dimidio latiore ( $\varphi$ );  
 oculis maris maximis, valde convexis, feminae mediocribus;  
 rostro apicem mesosterni attingente, articulo primo capiti  
 aequae longo; antennis articulo primo ( $\varphi$ ) capiti ab antico  
 viso longitudine vix aequali; pronoto crebre sat fortiter punc-  
 tato, scutello subtiliter transversim aciculato, hemielytris  
 sublaevibus.  $\sigma$   $\varphi$ . Long.  $7\frac{1}{3}$ — $7\frac{1}{2}$ , lat.  $2\frac{1}{2}$  mm.