

quam apice circiter duplo latius, disco sat dense et sat subtiliter punctulato, margine basaliq̄ flavicante. Scutellum transversim rugulosum, subtiliter punctulatum. Hemielytra subtiliter dense punctulata, dense flavicanti-pubescentia, membrana nigricante, venis piceo-testaceis. Tibiae posticae tarsis fere quadruplo longiores. Tarsi postici articulo secundo primo longiore, tertio secundo fere paullo brevior. Terebra feminae longa, circiter quintam basalem partem ventris attingens.

14. *Lygus apicalis* Fieb.

Reut., Hem. Gymn. Eur. V, p. 110, 29, T. V, f. 1.

Sierra Leone, D. Afzelius (Mus. Holm.).

15. *Lygidolon* nov. gen.

Corpus parvulum, superne nitidum, glabrum, inpunctatum, solum hemielytris obsoletissime subtiliter punctatis; capite sat lato, verticali, ab antico viso fortiter transverso, infra oculos parum producto, a latere viso brevi, oculis maris maximis, tota latera occupantibus, modice granulatis, a supero visis valde transversis, ab antico visis interne infra medium fortiter emarginatis, vertice stricturam apicalem pronoti obtegente, margine inter oculos recto, fortiter et crasse carinato, vertice ante marginem depresso, nitente, fronte planiuscula, clypeo sat brevi, leviter prominente, a latere viso ubique aequo lato, basi mox supra lineam inter scrobes antennarum ducendam posita, angulo faciali subrecto, loris carinatis, gula haud distinguenda; rostro apicem mesosterni attingente; antennis mox infra quartam apicalem partem marginis interioris oculorum insertis, articulo primo brevi, apicem capitis vix superante, secundo versus apicem levissime incrassato; pronoto transverso, trapeziformi, disco transversim leviter convexo, apicem versus parum declivi, aequali, callis nullis, apice medio carina obsoletissima longitudinali instructo, strictura apicale tenui, a margine verticis obtecta; scutello pronoto brevior, basi a pronoto obtecta; hemielytris (♂) abdomen sat superantibus, parallelis, cuneo margini basali aequo longo, membrana biareolata, areola majore an-