

oculis aequae longo, infra oculos longe acuminato-producto, parte infraoculari parti reliquae aequalonga, margine verticis tenuiter carinato; capite a latere viso altitudini aequae longo, fronte declivi, parum convexa, clypeo fortiter prominente, arcuato, a latere viso apicem versus latiore, basi in medio altitudinis capitis a latere visi posita, angulo faciali distincte acuto, loris haud convexis, genis (♀) mediocribus, gula brevi, horizontali; oculis laevibus, pronoto contiguis, in genas modice extensis, ab antico visis basi ac apice fere aequae distantibus, orbita interiore sat leviter sinuatis; rostro coxas posticas attingente, articulo primo caput paullo superante; antennis paullo supra apicem oculorum interne insertis, articulo primo apicem clypei parum superante, secundo modice longo, versus apicem sensim leviter incrassato; pronoto trapeziformi, apice quam basi circiter triplo angustiore, strictura apicali articulo primo antennarum aequae crassa, disco versus apicem sat fortiter convexo-declivi, medio carina obtusa usque ad stricturam apicalem percurrente leviter elevata, callis bene discretis, transversis, leviter obliquis, latera haud attingentibus, interne distantibus, margine basali basin scutelli tegente, lateribus rotundato, medio truncato; scutello pronoto brevior, versus apicem carina longitudinali leviter elevata; hemielytris (♀) abdomen modice superantibus, margine corii versus apicem leviter rotundato, commissura clavi scutello aequae longo, cuneo latitudini basali vix longior, basi in linea transversa per angulum basalem membranae ducenda posita; membrana biareolata, areola majore oblonga, angulo ejus interiore apicali acutiusculo; xypho prosterni triangulari, subplano, lateribus tenuiter marginato; mesosterno brevi; metastethio orificiis distinctis, margine anteriore eorum haud elevato, posteriore in carinulam transversam producto; coxis anticis medium mesosterni longe superantibus, posticis ab epipleuris hemielytrorum longe remotis.

### *Tropidophorella plagiata* n. sp.

Pallide cinerascenti-flavens, vertice margine postico, fronte utrinque strigis transversalibus grisescentibus; pronoto callis plagisque quattuor posticis piceo-nigris, his callos sed haud