

18. *Poecilosectus Voelzkovi* n. sp.

Piceo-niger, nitidus, tomento albido facillime divellendo vestitus, vertice macula utrinque ad oculum, pronoto strictura apicali margineque basali tenuiter, scutello apice, rostro dimidio basali, antennis articulo secundo, basi et $\frac{2}{5}$ apicalibus exceptis, tertio fere dimidio basali, coxis intermediis basi, tibiis posterioribus annulo lato anteapicali, tarsis articulis duobus primis orificiisque metastethii; lividis vel albido-flaventibus; hemielytris nigricanti-piceis, basi corii, lunula basali apiceque cunei sordide lividis; membrana nigricante, venis lividis, macula ad apicem cunei hyalina; pronoto crebre sat fortiter punctato; scutello transversim sat fortiter rugoso vix punctato; clavo distinctius, corio obsolete punctato, hoc apicem versus cuneoque laevigatis; antennis (♀) articulo secundo margine basali pronoti circiter $\frac{1}{4}$ brevior. ♀. Long. $3\frac{1}{4}$, lat. $1\frac{2}{5}$ mm.

Madagascar orientalis: Fenerivo, D. Voeltzkov, 1 ♀.

P. vittato m. nonnihil similis, mox autem pronoto dense et multo subtilius punctato scutelloque vix punctato distinguendus. Caput (♀) basi pronoti circiter $\frac{3}{7}$ angustius, ab antico visum latitudine cum oculis parum brevius, vertice oculo paullo latiore, fortiter marginato, margine carinato recto. Rostrum coxas posticas haud superans. Antennae (♀) graciles, articulo secundo primo fere quadruplo longiore, tertio secundo fere duplo brevior. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{2}{5}$ brevius, callis parum distinguendis, solum striis duabus transversim impressis pone stricturam apicalem. Hemielytra (♀) apicem abdominis sat longe superantia. Tibiae anticae totae, intermediae externe muticae, hae interne tenuiter testaceo-spinulosae, tibiae posticae tenuiter et parce piceo-spinulosae.

19. *Proboscidoris fuliginosus* Reut.

Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XXV, 1892, p. 30, 60. Ibid. XLVII, N:o 10, 1905, p. 15, 17.

Insulae Fenda et Pumba, D. Voeltzkov.