

mielytra commissura clavi scutello circiter dimidio longiore. Pectus nigro-pilosulum. Pedes dense et fortiter sed sat breviter nigro-pilosi, tibiis spinulis pilis longioribus et crassitiei tibiae aequae longis, nigris, aroliis unguiculorum albidis. Terebra feminae medium ventris attingens.

24. *Fulvius discifer* n. sp.

Fusco-niger, opacus, brevissime nigro-pilosellus, paullo magis quam quarta parte apicali articuli secundi antennarum niveo; rostro pedibusque cum coxis nigro-fuscis, tibiis apice tarsisque paullo dilutioribus; hemielytris obscure ligneis, brevissime nigro-pubescentibus, clavo margine scutellari basique anguste, corio basi anguste maculaque sat minuta media discoidali pallide testaceis, embolio macula parva apicali albidula; antennis ad medium marginis interioris oculorum insertis, articulo primo apicem clypei fere dimidio longitudinis superante, latitudine frontis interoculari longitudine subaequali, secundo primo duplo longiore, margine basali pronoti circiter $\frac{1}{5}$ brevioris (♀), sat robusto, apicem versus incrassato sed primo distincte graciliore; pronoto latitudine basali fere $\frac{2}{5}$ brevioris, lateribus antice leviter rotundatis, postice late leviter sinuatis; hemielytris abdominis longitudine, cuneo horizontali. ♀. Long. $3\frac{1}{5}$, lat. $1\frac{1}{4}$ mm.

Insula Funda prope Pueblam sub cortice humido, D. Voeltzkov, 3 spp.

F. brevicorni Reut. similis et affinis, colore rostri et pedum, hemielytris basi multo angustius pallidis, sed medio disci corii pallido-signatis distinguendus. Caput porrectum, pronoto vix longius, vertice (♀) oculo fere triplo latiore, lineola longitudinali sat obsolete impressa, fronte versus apicem leviter declivi, angulo faciali fortiter acuto, genis nullis. Oculi a supero visi fere semiovaes, a latere visi usque in gulam extensi. Antennae articulo primo longitudine capitatis fere $\frac{2}{5}$ brevioris, ultimis gracillimis, tertio secundo fere $\frac{2}{5}$ brevioris. Pronotum apice quam basi circiter duplo angustius, strictura apicali distincta, callis leviter convexis, medio linea tenui impressa disjunctis, postice longe ultra me-