

Boopidella fasciata n. sp.

Fuliginosa, opaca, rostro, articulo primo excepto, coxis, femoribus basi, tibiis apicem versus tarsisque pallidis; hemielytris fascia per medium clavi ducta alba, hac fascia versus marginem exteriorem corii angustata; membrana dilutius fuliginoso-fumata, parte basali albida. ♂. Long. $2\frac{2}{5}$, lat. $\frac{3}{5}$ mm.

Insula Pemba, D. Voeltz kov, 4 spp.

Caput (♂) basi pronoti aequa latum, ab antico visum latitudini verticis oculique unici aequa longum. Antennae articulo secundo primo circiter triplo longiore et margine basali pronoti fere $\frac{1}{4}$ breviore, primo ima basi pallidiore, tertio secundo circiter $\frac{2}{3}$, breviore, quarto tertio paullo breviore. Pronotum latitudine basali paullo magis quam $\frac{2}{5}$ brevius, basi quam apice circiter duplo latius.

27. Allodapus aethiopicus n. sp.

Nigro-fuscus, opacus, sat parce breviter parum tenuiter flavicanti-pubescent, hemielytris adhuc longe pallide pilosis, sanguinolenti-fuscis, opacis, corio macula basali, margine exteriore maculaque apicali albis, macula basali medium subattingente et apice oblique truncata, externe quam interne paullo longiore, macula apicali marginem interiorem haud attingente, externe quam interne latiore; macula mox pone maculam basalem obscure fusca, sericeo-opaca; rostro, articulo primo excepto, antennis pedibusque pallide flaventibus, basi margineque apicali articuli primi antennarum femoribusque, basi apiceque exceptis, sanguineis. Long. $2\frac{2}{3}$ mm.

Congo, D. Schouteden. Insula Pemba: Funda, D. Voeltz kov.

Corpus subelongatum. Caput basi pronoti circiter $\frac{1}{4}$ angustius, clypeo (an semper?) pallido, angulo faciali subrecto, vertice (♀) oculo paullo latiore, Rostrum articulo primo medium xyphi attingente. Antennae articulo secundo capiti pronotoque simul sumtis longitudine aequali. Pronotum apice quam basi circiter $\frac{3}{7}$, angustius, latitudini apicali aequa latum, lateribus fortiter sinuatis. Scutellum parum convexum.