

sat angusta apicali corii apiceque cunei, lateribus pectoris, annulis duobus anteapicalibus femorum intermediorum, femoribus posticis, geniculis annuloque subbasali tibiaram posticarum dimidioque apicali articuli ultimi tarsorum obscure piceis, femoribus posticis basi, maculis obsoletis mediis annulisque duobus tenuibus apicalibus inferne distinctioribus olivaceis; membrana sat leviter fumata, venis olivaceo-flaventibus, areolis apice nigro-fuscis, linea juxta cuneum fasciaque mox infra medium pallidis; antennis pedibusque colore corporis, illis totis pallidis, articulo secundo margini basali pronoti aequae longo, duobus ultimis simul sumtis secundo longitudine subaequalibus; tibiis testaceo-spinulosis; capite verticali, ab antico viso transverso, a latere viso altitudine saltem duplo brevior, vertice oculo latitudine subaequali, tenuiter et medio adhuc tenuius marginato; pronoto hemielytrisque dense aequaliter sat subtiliter punctatis, cuneo laevi; scutello convexiusculo, dense ruguloso. ♀. Long. 3 1/2, lat 1 1/2 mm.

Mandeville, unicum specimen.

Praecedenti simillimus et forsitan solum varietas ejus, signaturis piceis magis dilatatis, sed antennis totis pallidis, apice extremo scutelli pallido membranaque dilatiore distinctus videtur.

9. *Lygus cunealis* n. sp.

Parvus, oblongo-ovalis virescens, superne olivaceus, glaber, sat nitidus, capite lurido vel nigro-fusco, lateribus pallido, nutante, ab antico viso latitudini cum oculis aequae longo, a latere viso altitudine paullulum brevior, gula longa, obliqua, vertice (♀) oculo circiter 1/4 latiore, margine levissime carinato lateribus quam medio paullo fortius carinato; pronoto macula utrinque exteriori callorum angulisque posticis vel toto disco postico, limbo basali excepto, nigro-piceis, disco postico subtilissime punctulato; scutello transversim striguloso, nigro-piceo, apice vel etiam vitta longitudinali testacea; clavo nigro-piceo, dense subtiliter punctato; corio parce punctato, olivaceo-virescente, infra medium plaga magna postice dilatata in angulum interiorem exeunte nigro-picea; cuneo laevi, olivaceo, apice concolore, sed limbo exteriori a basi