

Leucopoeila albofasciata n. sp.

Nigricans, nitidus, antennis totis, rostro, coxis femoribusque nigris. his extremo apice, tibiis tarsisque pallide flavo-testaceis, tibiis posticis basin versus articuloque ultimo tarsorum nigro-fuscis; spinulis tibiaram posticarum e punctis minutissimis nigricantibus nascentibus; hemielytris nigro-fuscis, cum scutello breviter minus tenuiter flavo-pubescentibus; corio subtiliter punctulato, fascia transversali ante medium corii et clavi maculaque corii supra basin cunei albidis, membrana cum areolis venisque fumata. ♂ long. 2, lat. 1, ♀ long. 1½, lat. 1 mm.

Kingston.

30. *Sthenarus plebejus* n. sp.

Ovalis, piceo-niger, nitidus, articulis intermediis rostri duobusque primis antennarum, femoribus totis vel apice late, tibiis tarsisque pallide ochraceis, articulis ultimis antennarum raroque secundo apicem versus fuscentibus, tibiis punctis destitutis, spinulis concoloribus pallidis armatis, tibiis posticis interdum picescentibus, tarsis apice fuscis; capite basi pronoti circiter ¼ angustiore, margine verticis tenui latissime arcuato; rostro coxas posticas longius superante; antennarum articulo secundo latitudini basali capitis cum oculis aequae longo; pronoto disco postico subtilius ruguloso, angulis basilibus interdum anguste pallidis; hemielytris squamulis aureis facillime divellendis parcius vestitis. ♀. Long. 1¼, lat. fere 1 mm.

Mandeville, plura spec; Tambillo, D. Otto, 1 spec. (Mus. Vindob.).

31. *Sthenarus basalis* n. sp.

Ovalis, piceo-niger, nitidus, capite testaceo, vertice picescente, oculis nigro-fuscis; rostro, articulis duobus primis antennarum (ultimi desunt) pedibusque cum coxis pallide testaceis, articulo secundo antennarum latitudini verticis oculique unici fere aequae longo, versus apicem distincte incrassato et tertia apicali parte piceo-nigro; femoribus posticis punctis