

Capsidae novae in insula Jamaica

mense aprilis 1906

a D. E. P. Van Duzee collectae.

Descripsit

O. M. REUTER.

Div. **Bryocoraria** Reut.

1. *Pycnoderes* Van Duzeei n. sp.

Ovalis, niger, capite basi pronoti duplo angustiore, fronte marginibus utrinque ad oculos tenuiter testaceis; pronoto pone callos minutos fortiter tumido-convexo, scutellum ad maximam partem tegente, crebre punctato, disco basali impressionibus destituto; hemielytris opacis, embolio anguste explanato, subreflexo, flavicanti-albido, corio gutta anteapicali anguli exterioris alba in embolium extensa, cuneo latitudini basali aequae longo, albo, margine basali anguloque interiore nigris, apice anguste nigro-marginato, membrana alba, venis vittaque longitudinali media nigris; rostro, antennis totis pedibusque cum coxis dilute flavicanti-albis. Long. $2-2\frac{1}{4}$, lat. hem. $\frac{3}{4}$ mm.

Mandeville.

P. atrato (Dist.) structura pronoti et embolii signaturaque membranae affinis, statura paullo minore et distincte graciliore coloreque embolii, antennarum et pedum divergens.

2. *Pycnoderes angustatus* n. sp.

Subelongatus, piceo-niger, nitidus, capite basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$ angustiore, marginibus frontis ad oculos testaceis, interdum capite toto, vertice excepto, testaceo; pronoto fortiter punctato, latitudini basali saltem aequo longo, circiter $\frac{2}{5}$ apicalibus collum parallelum formantibus, lateribus dein subito retrorsum ampliatis, callis majusculis, elevatis, nitentibus, medio retrorsum convergentibus, disco tumido-convexo, postice utrinque prope angulos distinctissime, medio parum impresso, margine basali late sinuato; scutello convexiusculo, punctato, parte apicali coarctata pronoti parum brevior; hemielytris pronoto vix latioribus, nigro-fuscis, opacis, tenuiter flavo-pubescentibus, embolio sat late explanato, hoc, macula adjectante anguli exterioris corii, cuneo, nec non areola minore maculaque majuscula membranae fuscae infra apicem cunei posita dilutissime flavicanti-albidis; macula magis minusve distincta mox infra tertiam apicalem partem embolii ipsoque margine apicali embolii et corii infuscatis, cuneo apice tenuiter fusco-marginato; rostro, antennis pedibusque cum coxis albido-flaventibus, articulo secundo antennarum margine basali pronoti circiter $\frac{1}{4}$ brevior, articulis duobus ultimis, basi tertii excepta, fuscis. Long. $3\frac{1}{3}$, lat. $\frac{3}{4}$ mm.

Montego Bay, Mandeville.

P. pallidirostri Stål affinis et similis, statura angustior et gracilior, parte apicali constricta pronoti longior, disco postico pronoti magis nitido et minus crebre punctato coloreque antennarum distinctus.

3. *Bryocoris minutus* n. sp.

Piceo-niger, nitidus, tenuissime pallido-pubescent; capite basique abdominis testaceis vel picescenti-testaceis; hemielytris, rostro, articulis duobus primis antennarum pedibusque flavo-testaceis, clavo ad maximam partem, corio fascia apicali cuneoque angulo interiore nigro-piceis; membrana fumata, venis nigro-piceis; antennis articulo secundo basi pronoti fere $\frac{1}{4}$ brevior; pronoto strictura apicali tenui, callis

parum distinctis, disco omnium subtilissime punctulato; scutello distincte transversim strigoso; hemielytris completis nitidis, subtiliter punctulatis, corio breviusculo, cuneo magno corio circiter $\frac{1}{4}$ brevior. Long. 2, lat. $\frac{3}{4}$ mm.

Mandeville.

Br. pteridis Fall. statura, colore signaturisque sat similis, sed fere dimidio minor et gracilior, antennis brevioribus, callis pronoti vix distinguendis, corio brevior cuneoque longior, nec non signatura picea hemielytrorum divergens.

Div. **Clivinemaria** Reut.

4. *Lamproseytus* nov. gen.

Corpus oblongum, laevissimum et nitidissimum, glabrum; capite subverticali, basi pronoti duplo angustiore, a superno viso pronoto duplo brevior et longitudine saltem duplo latior, margine antico truncato, pone oculos parvulos globosos in collum retrorsum angustatum constricto, vertice lato; capite ab antico viso fortiter transverso, infra oculos breviter producto, a latere viso altitudine paullulum brevior, fronte convexuscula, fortiter declivi, clypeo prominente, scrobibus antennarum superne a linea oblique impressa terminatis, genis oculis altitudine subaequalibus, gula fortiter obliqua, peristomio aequae longa; oculis parvulis, laevibus, a superno visis globosis, sat exsertis, ab apice pronoti longe remotis, a latere visis verticalibus, oblongis, in genas breviter extensis, ab antico visis orbita interiore parallelis; rostro coxas intermedias subattingente, articulo primo basin capitis vix attingente; antennis validis, ad apicem oculorum interne insertis, articulo primo magis quam dimidio apicali apicem clypei superante, secundo margine basali pronoti aequae longo, jam basi primo crassitie subaequali, a basi sensim apicem versus fortius incrassato; pronoto latitudine postica paullo brevior, basi quam apice saltem triplo latior, apice strictura lata sub angulo obtuso oblique antrorsum et leviter sursum vergente instructo, margine apicali truncato, pone stricturam sulco profundo usque ad marginem lateralem extensa sed latera haud superante, marginibus lateralibus ad sulcum suba-

cutis, pone sulcum versus basin fortiter divergentibus, disco postico fortiter convexo et versus sulcum fortiter declivi; scutello triangulari, subexcavato, marginibus elevatis, his apiceque externe declivibus; hemielytris abdomen longe superantibus, convexis, lateribus declivibus, commissura clavi scutello longiore, venis parum distinctis, cuneo a corio incisura exteriori profundissima acutangulari discreto, dimidio basali marginis exterioris introrsum valde obliquo, membrana areola majore latissima, subsemicirculari, areola minore angustissima, vena cubitali tenuissima; areola alarum hamo destituta; pedibus longis, femoribus linearibus, tibiis muticis, tarsis articulo secundo brevi.

Genus valde insigne, corpore cum hemielytris laevissimis et nitidissimis, structura pronoti cuneoque a corio incisura exteriori profundissima discreto ab omnibus facillime distinguendum.

Lamproscytus Van Duzeei n. sp.

Niger vel picescenti-niger, nitidissimus, glaberrimus, laevissimus, annulo subbasali articuli primi apiceque secundi antennarum (articuli ultimi desunt), nec non apice tibiarum sat late albis; hemielytris castaneo-rufis vel laete lateritiis, membrana fumata, venis castaneo-rubris, pone medium macula majore triangulari alba, basi ejus mox infra medium membranae posita, apice in apicem membranae extenso; abdomine piceo-rufo. ♂. Long. $2\frac{1}{3}$, lat. $\frac{3}{4}$ mm.

Mandeville.

Div. **Capsaria** Reut.

5. Phytocoris compsocerus n. sp.

Superne sat dense et modice longe nigro-pilosus, pilis leviter retrorsum vergentibus, parce albo-intricato-pubescent, opacus; capite rubido-albo, utrinque ferrugineo-striato, fortiter nutante, a latere viso altitudine distincte brevior, fronte valde declivi; vertice (♀) oculo paullulum latiore; rostro medium ventris subattingente, griseo, apice nigro; antennis tenuibus, articulo primo pronoto longitudine subaequali, albo,

ima basi annulisque 3—4 obliquis nigro-fuscis, articulis reliquis nigricantibus, secundo et tertio basi annuloque infra medium albis, secundo primo parum magis quam duplo longiore, tertio primo paullo longiore; pronoto virescenti-griseo, antice pallido, ferrugineo-signato, lateribus late vittisque duabus latis pone callos basin subattingentibus nigro-fuscis (vel nigro-fusco, vittis tribus angustis pallidis); scutello virescenti-griscescente, maculis duabus nigro-fuscis; hemielytris albidocervinis, clavo praecipue externe embolioque nigro-fusco-conspersis, corio maculis minoribus ante medium majoreque ante maculam rhombeam nitidam apicalem nigro-fuscis, cuneo apice nigro-fusco, puncto nigro ad angulum interiorem; membrana hyalina, nigricanti-irrorata, venis pallidis, cubitali nigricante, limbo exteriori macula ad apicem cunei aliaque media hyalinis; corpore inferne sordide albedo, lateribus infuscato; pedibus albidis, femoribus nigricanti-conspurcatis, posticis crassitie maxima circiter quintuplo longioribus (♀), fascia albida anteapicali, tibiis albo-spinulosis, spinulis crassitie tibiae longioribus, tibiis anterioribus annulis tribus sat angustis nigro-fuscis, inferiore obsoletiore, posticis nigro-fusco-adspersis, tarsis articulo ultimo apice fusco. ♀. Long. 5, lat. $1\frac{3}{5}$ mm.

Mandeville.

Ph. eximio Reut. affinis, pronoto vittato, hemielytris aliter coloratis, signaturis ferrugineis destitutis, articulis secundo et tertii antennarum infra medium albo-annulatis distinctus videtur.

6. *Lygus aeruginosus* n. sp.

Dilute aeruginosus, superne glaber, nitidus, disco pronoti subtiliter modice dense punctato; scutello transversim subtiliter strigoso, clavo corioque aequaliter minus subtiliter sat remote punctatis, cuneo laevi; clypeo vitta picea; oculis nigro-fuscis; scutello vittis duabus approximatis basalibus, clavo margine scutellari commissuraque piceo-nigris, corio cuneoque unicoloribus, margine exteriori concolore; membrana subhyalina, parum signata, venis virescentibus, brachiali apicem versus picea; rostro apicem coxarum posticarum

attingente, apice nigro; antennis articulo primo virescente, secundo margine basali pronoti circiter $\frac{2}{5}$ brevior (σ), $\frac{2}{5}$ apicalibus nigris, ultimis simul sumtis secundo paullo longioribus, nigris; pedibus dilute virescentibus, femoribus posticis annulis duobus tenuibus anteapicalibus piceis, tibiis anticis submuticis, posterioribus piceo-spinulosis, tarsis dimidio apicali articuli ultimi nigro-piceo; capite verticali, a latere viso altitudine circiter duplo brevior, clypeo parum prominente, vertice (σ) oculo circiter $\frac{1}{3}$ latiore, aequaliter marginato, margine recto. σ . Long. $3\frac{3}{5}$, lat. $1\frac{3}{7}$ mm.

Mandeville.

7. *Lygus olivaceus* n. sp.

Parvus, ovalis, olivaceus, superne nitidus, dense tenuiter flavo-pubescens; oculis nigro-fuscis, scutello apice, clavo maris ante medium interne, macula communi anguli interioris corii et cunei apiceque cunei obscure piceis; membrana cum venis nigricanti-fumata, feminae saepe fascia pallidior signata; pectore concolore (φ) vel lateribus piceo (σ); rostro, antennis pedibusque colore corporis, rostro apicem coxarum posticarum attingente, ipso apice nigro; antennis articulo secundo margine basali pronoti vix brevior (φ) vel nonnihil longior (σ), apice anguste nigro, ultimis simul sumtis secundo aequae longis, nigro-fuscis, tertio basi anguste testaceo; femoribus feminae concoloribus, maris posticis apice piceis, tibiis testaceo-spinulosis, tarsis dimidio apicali articuli ultimi nigro; capite verticali, ab antico viso fortiter transverso, a latere viso altitudine magis quam duplo (σ) vel fere duplo (φ) brevior, clypeo parum prominente, vertice oculo aequae lato (φ) vel hoc distincte angustior (σ), margine recto medio quam lateribus tenuius carinato; pronoto hemielytrisque aequaliter crebre subtiliter punctatis, cuneo laevi. σ φ . Long. $3\frac{2}{5}$, lat. $1\frac{1}{2}$ mm.

Mandeville.

8. *Lygus suspectus* n. sp.

Parvus, ovalis, olivaceus, superne nitidus, dense tenuiter flavicanti-pubescens; capite, fascia lata basali pronoti ante marginem, dimidio apicali scutelli, ipso apice excepto, fascia

sat angusta apicali corii apiceque cunei, lateribus pectoris, annulis duobus anteapicalibus femorum intermediorum, femoribus posticis, geniculis annuloque subbasali tibiaram posticarum dimidioque apicali articuli ultimi tarsorum obscure piceis, femoribus posticis basi, maculis obsoletis mediis annulisque duobus tenuibus apicalibus inferne distinctioribus olivaceis; membrana sat leviter fumata, venis olivaceo-flaventibus, areolis apice nigro-fuscis, linea juxta cuneum fasciaque mox infra medium pallidis; antennis pedibusque colore corporis, illis totis pallidis, articulo secundo margini basali pronoti aequae longo, duobus ultimis simul sumtis secundo longitudine subaequalibus; tibiis testaceo-spinulosis; capite verticali, ab antico viso transverso, a latere viso altitudine saltem duplo brevior, vertice oculo latitudine subaequali, tenuiter et medio adhuc tenuius marginato; pronoto hemielytrisque dense aequaliter sat subtiliter punctatis, cuneo laevi; scutello convexiusculo, dense ruguloso. ♀. Long. $3\frac{1}{2}$, lat $1\frac{1}{2}$ mm.

Mandeville, unicum specimen.

Praecedenti simillimus et forsitan solum varietas ejus, signaturis piceis magis dilatatis, sed antennis totis pallidis, apice extremo scutelli pallido membranaque dilatata distinctus videtur.

9. *Lygus cunealis* n. sp.

Parvus, oblongo-ovalis virescens, superne olivaceus, glaber, sat nitidus, capite lurido vel nigro-fusco, lateribus pallido, nutante, ab antico viso latitudini cum oculis aequae longo, a latere viso altitudine paululum brevior, gula longa, obliqua, vertice (♀) oculo circiter $\frac{1}{4}$ latiore, margine levissime carinato lateribus quam medio paullo fortius carinato; pronoto macula utrinque exteriore callorum angulisque posticis vel toto disco postico, limbo basali excepto, nigro-piceis, disco postico subtilissime punctulato; scutello transversim striguloso, nigro-piceo, apice vel etiam vitta longitudinali testacea; clavo nigro-piceo, dense subtiliter punctato; corio parce punctato, olivaceo-virescente, infra medium plaga magna postice dilatata in angulum interiorem exeunte nigro-picea; cuneo laevi, olivaceo, apice concolore, sed limbo exteriore a basi

ultra medium nigro-piceo; membrana fumata, venis flavo-testaceis, striola angusta inter areolam minorem et apicem cunei hyalina; rostro pedibusque pallide virentibus, illo apicem coxarum posticarum attingente, femoribus posticis saepe ante apicem infuscat, tibiis anticis submuticis, posterioribus spinulis concoloribus instructis, posticis basi anguste piceis, tarsis articulo ultimo nigro-piceo; antennis testaceis, articulo secundo (♀) margini basali pronoti aequae longo, tertia apicali parte nigro, ultimis simul sumtis secundo paullo longioribus, nigris, tertio basi anguste albido. ♀. Long. $2\frac{4}{5}$, lat. $1-1\frac{1}{4}$ mm.

Mandeville.

Species parva, structura capitis, colore signaturisque, praecipue signatura cunei distinctissima.

10. *Poecilosectus cuneatus* Dist.

Var. rufo-cuneatus:

Ut typus, sed hemielytris sordide flavo-testaceis, clavo interne, corio plaga infra medium posita nigricantibus, cuneo disco purpureo, marginibus flavo-testaceis; femoribus pallide flavo-testaceis, posticis dimidio apicali castaneis.

Mandeville.

11. *Poecilosectus flavocuneatus* n. sp.

Superne colore varians, nitidus, livido-ochraceus vel testaceus, tomento aureo vestitus, magis minusve nigro-signatus, scutello toto vel ad maximam partem cuneoque toto pallidis; hemielytris margine exteriori concolore, pallido, membrana fumata, venis flavo-testaceis; mesosterno medio fusco; rostro, antennis pedibusque flavo-testaceis, articulo secundo antennarum apicem versus ultimisque nigro-fuscis, tertio basi anguste testaceo, secundo utriusque sexus sat gracili, margini basali pronoti aequae longo; tarsis articulo ultimo toto nigro; capite maris ab antico viso distincte transversa, oculis magnis, vertice oculo aequae lato; pronoto laevigato; scutello omnium levissime aciculato. ♂. Long. $2\frac{3}{4}$, lat. $1\frac{1}{2}$ mm.

Var. α: Inferne pallide flavo-testacea, mesosterno medio fusco; superne pallide flavo-testacea, oculis, clypeo, medio

verticis, neaculis duabus magnis discoidalibus pronoti, angulis basalibus scutelli ad angulum anteriorem commissuraque, corio plaga obliqua infra medium fusco-nigris; femoribus posticis versus apicem punctis seriatis nigro-piceis. ♂.

Var. β: Inferne flavo-testacea, pectore lateribus limboque laterali ventris utrinque infuscatis, area orificiorum metastethii straminea, mesosterno fusco; capite cum oculis nigro-fusco, marginibus frontis ad oculos lorisque testaceis; pronoto piceo-nigro, apice sat late margineque basali tenuiter testaceis, angulis apicalibus macula nigerrima notatis; scutello testaceo, margine laterali utrinque ultra medium nigro-piceo; hemielytris testaceis, clavo maximam ad partem corioque plaga maxima apicali triangulari nigro-piceis, sutura clavi limboque exteriore totis pallidis; femoribus punctis piceis seriatis adspersis, posticis annulis duobus anteapicalibus piceis, tibiis geniculis piceis. ♂.

Kingston.

P. cuneato Dist. statura, magnitudine, structura antenarum et verticis, sculptura pronoti etc. simillimus et verisimiliter solum ejus varietas.

12. *Cyrtocapsidea irrorata* n sp

Fusco-ferruginea, capite, pronoto scutelloque pube flavescente nitida vestitis, pronoto scutelloque sat nitidis, illo dense, hoc parcius sat fortiter impresso-punctatis, pronoto pone callos vittis tribus latis vel disco fere toto nigro-fusco, margine basali pallido; scutello nigro-fusco, apice pallide testaceo; hemielytris opacis, laevibus, tomento aureo vel argenteo in maculas collocato vestitis, clavo margine scutellari apicem versus, corio macula infra medium, ectocorio apicem versus maculaque anguli interioris apicalis nec non cuneo nigro-fuscis, corio margine apicali extrorsum, cuneo fascia obliqua angulum anteriorem terminante apiceque pallide testaceis, clavo corioque maris interdum nigro-fuscis, solum basi ferrugineis; membrana nigricante, venis pallide flavescentibus, areola minore maculaque parva ad apicem cunei nec non saepe fascia irregulari fere media albido-hyalinis; rostro, antennis pedibusque albido-flavescentibus, antennis articulo primo

toto, secundo annulo angusto subbasali tertiaeque parte apicali nec non ultimis nigro-fuscis, extrem abasi secundi et tertii alba, secundo latitudine capitis cum oculis saltem $\frac{1}{3}$ longiore, duobus ultimis simul sumtis secundo distincte paullo brevioribus; femoribus anticis annulis duobus anteapicalibus, posticis apice late nigro-piceis; vertice oculo aequae lato (♀) vel hoc distincte angustiore (♂), oculis maris magnis, valde convexis. ♂ ♀. Long. $2\frac{3}{4}$ —3, lat. $1\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{2}$ mm.

Mandeville; Mexico, D. Bilimek (Mus. Vind.).

C. nebulosae Reut. similis, statura majore et magis oblonga, antennis longioribus, oculis majoribus et magis convexis, vertice angustiore divergens.

13. *Neoborops oculatus* n. sp.

Livido-testaceus, pronoto cum epipleuris scutelloque aequaliter sat dense et fortiter impresso-punctatis, subglabris; scutello vittulis duabus parallelis anteapicalibus fuscis, ipso apice albido, calloso-laevigato; hemielytris pilis brevibus aureo-nitentibus minus tenuibus pubescentibus, clavo medio, corio macula ante medium fasciaque lata apicali dilute fuliginosis, cuneo extremo angulo interiore basali piceo; membrana dilute fumata, venis albidis, areola majore apice minoreque tota nigricantibus, limbo exteriori macula minore ad apicem cunei magnaue subquadrata ante medium albidohyalinis, his maculis postice late nigricanti-terminatis; rostro, antennis pedibusque livido-testaceis, articulo secundo antenarum toto concolore, primo $2\frac{1}{2}$ longiore, articulo ultimo tarsorum apice infuscato; capite maris ab antico viso fortiter transverso, oculis maximis, convexis, nigro-fuscis, fortiter granulatis, maximam ad partem ultra angulos anticos pronoti exsertis, vertice oculo saltem duplo angustiore, margine recto tenuiter carinato, ante marginem impressione longitudinali oblique striolata instructo; pronoto latitudine basali circiter $\frac{1}{4}$ brevior, limbo basali utrinque ante angulum depresso, angulis basalibus subnodosis. ♂. Long. fere 4, lat. $1\frac{1}{2}$ mm.

Mandeville.

Div. **Cyllocoraria** Reut.14. **Zanchisme** ¹⁾ **illustris** n. sp.

Elongatus, cum rostro, antennis pedibusque fuscis, capite, pronoto scutelloque nitidis, hemielytris obscurioribus, opacis, solum embolio apice late cuneoque toto nitidis, sutura clavi pallida, clavo basi fasciolisque 3—4, corio puncto mox ante medium fasciaque mox pone medium argenteo-squamosis; antennis articulo primo basi et interne, secundo et tertio apice, hoc anguste, tibiis apicem versus tarsisque basi pallide flavo-testaceis, coxis apice, trochanteribus basique femorum posteriorum anguste albidis; capite ab antico viso oblongo-ovato, latitudine media frontis duplo longiore, a latere viso fortiter nutante, altitudine fere (♂) vel vix (♀) duplo brevior, angulo faciali fortiter acuto; antennis articulo secundo latitudini posticae capitis (♂) vel verticis (♀) longitudine subaequali, duobus ultimis simul sumtis secundo parum vel paullo longioribus, quarto tertio nonnihil longiore; pronoto latitudine basali fere nonnihil longiore, parte apicali constricta utrinque ante apicem spina magna laterali sursum et levissime antrorsum et extrorsum vergente armato, parte postica fortiter aequaliter gibbosa-elevata, quam spinis paullo altiore; membrana fumata, sutura ad cuneum tenuiter pallida. Long. 3, lat. $\frac{3}{4}$ mm.

Mandeville.

Z. dromedario Reut. affinis, differt corpore longiore, capite multo longiore, minus convexo, spinis pronoti longioribus et acutioribus, parte ejus postica aequaliter tumido-convexa, etc.

15. **Falconia** **caduca** Dist. Var.

Differt a typo: capite, pronoto articulisque duobus primis antennarum totis albidis vel clypeo nigricante, hemielytris solum angulo interiore basali margineque adjacente corii nigro-fuscis, commissura clavi apiceque cunei tenuiter fuscis; metasterno segmentoque maris genitali nigro-fusco; femori-

¹⁾ *Zanchisme* Kirk. = *Schizonotus* Reut., nom. praecoc. Hoc genus in Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 401 describitur.

bus posticis vitta superiore nigricante instructis vel destitutis. ♂ ♀.

Mandeville.

16. *Baculodema* nov. gen.

Corpus lineare, angustissime elongatum, superne nitidum, cum capite impresso-punctatum, capite pronotoque setis sat longis erectis sat parce pilosis, hemielytris pilis brevioribus et tenuioribus retrorsum vergentibus pubescentibus; capite basi pronoti aequae lato, a supero viso longitudine sua vix duplo latiore, inter oculos in angulum obtusum prolongato, vertice utrinque ante marginem transversim impresso; capite ab antico viso fortiter transverso, quinquangularem, a latere viso subrectangularem, clypeo leviter prominulo, verticali, basi paullo infra tertiam basalem partem altitudinis capitis a latere visi posita, angulo faciali recto, genis (♀) sat altis sed oculis humilioribus, gula brevi, horizontali; oculis laevibus, a supero visis modice exsertis, distinctissime retrorsum vergentibus, angulis anticis pronoti contiguus, a latere visis distincte leviter transversis, ab antico visis orbita interiore recta versus apicem leviter divergentibus; antennis gracilibus, articulis omnibus pilosis, primo capite a supero viso distincte longiore, secundo lineari, primo parum magis quam dimidio longiore, ultimis tenuibus; pronoto latitudini basali fere longiore, apice quam basi circiter $\frac{1}{3}$ angustiore, strictura destituto, limbo apicali ante callos distincte punctato, lateribus usque ad medium parallelis, dein sat divergentibus, callis horizontalibus, fere medium longitudinis pronoti attingentibus, disco postico antrorsum levissime convexo-declivi, margine basali subrecto, angulis basalibus rectis; scutello planiusculo, pronoto duplo brevior, basi oblecta; hemielytris basi pronoti aequae latis, lateribus levissime rotundatis, commissura clavi scutello duplo longiore, corio versus latera declivi, cuneo a corio incisura exteriori profunda discreto, brevi et angusto, parum distinguendo, pellucido, cum membrana subconfluente; membrana biareolata, areolis angustis; mesosterno sat longo, horizontali; coxis anticis acetabula parum superantibus; pedibus gracilibus, femoribus linearibus,

tibiis tenuiter sed sat longe spinulosis, tarsis articulo ultimo apicem versus levissime incrassato, aroliis parallelis.

Genus insigne, forsitan divisionis propriae, statura sub-lineari, valde elongata, structura capitis a latere visi sub-rectangularis, oculis retrorsum vergentibus, a latere visis distincte transversis, pronoto longo, lateribus sinuato, cuneo minutissimo, a corio incisura profunda discreto sed cum membrana subconfluente, tarsis apice nonnihil dilatatis distinctissimum; generi *Ficinus* Dist. statura nonnihil similis videtur, structura antennarum mox distinguendus.

Baculodema luridum n. sp.

Luridum, nitidum, superne lurido-setosum et -pilosum, capite scutelloque parcius, pronoto, callis exceptis, hemielytrisque densius et fortius minus subtiliter punctatis; corio macula picea marginis interioris infra commissuram; membrana obscure fuliginosa, macula albida ad apicem cunei; inferne, capite excepto, nigro-piceum; rostro, antennis pedibusque lividis, apice articuli secundi antennarum articulisque ultimis fusciscentibus, tertio basi livido; vertice oculo ³/₄ latiore; antennis articulo secundo primo paullulum magis quam dimidio longiore, tertio primo longitudine subaequali. ♀. Long. $2\frac{3}{4}$, lat. $\frac{2}{3}$ mm.

Mandeville.

17. *Ceratopsus* ¹⁾ *nigro-piceus* n. sp.

Oblongus, angustulus, nigro-piceus, nitidus, superne setis longis testaceis semierectis retrorsum vergentibus setosus, scutello hemielytrisque adhuc pilis brevissimis punctiformibus, cervino-albidis dense pubescentibus; membrana nigricantifumata, venis nigro-piceis, juxta dimidium apicalem marginis cunei vitta obliqua areolam minorem occupante et usque ad apicem cunei producta albida; rostro, antennis totis pedibusque pallide testaceis, articulo primo rostri, basi coxarum, femoribus tibiisque posticis nigro-piceis, femoribus posticis

¹⁾ *Ceratopsus* Reut. = *Melinna* Uhler.

basi latius apiceque anguste, tibiis posticis basi anguste apiceque paullo latius, testaceis, interdum etiam femoribus intermediis ante apicem picescentibus; vertice oculo distincte angustiore (σ^7) vel hoc circiter $\frac{3}{5}$ latiore (φ); antennis articulo secundo margine basali pronoti circiter $\frac{1}{5}$ brevior, duobus ultimis simul sumtis secundo parum longioribus, quarto tertio paullo brevior; rostro apicem coxarum posticarum attingente; pronoto latitudine postica $\frac{2}{5}$ — $\frac{3}{7}$ brevior, lateribus late sinuatis, omnium subtilissime subobsolete punctulato. σ^7 φ . Long. $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{2}{3}$, lat. 1 mm.

Mandeville.

C. elongato (Uhler) nonnihil affinis, antennis totis testaceis, colore pedum posticorum, hemielytris totis nigro-piceis nec limbo exteriori pallido, colore membranae etc., mox distinctus.

18. *Ceratocapsus consimilis* n. sp.

Obscure piceus, nitidus, superne setis longis pallidis semierectis retrorsum vergentibus pilosus, scutello hemielytrisque pilis brevissimis punctiformibus cervino-albidis pubescens; membrana fusco-fumata, juxta dimidium apicalem marginis cunei vitta obliqua albida; rostro, antennis (articuli ultimi desunt) pedibusque pallido-testaceis, femoribus posticis medio late piceis; vertice (φ) oculo dimidio latiore; rostro apicem coxarum intermediarum attingente; antennis articulo secundo margine basali pronoti fere $\frac{1}{3}$ brevior; pronoto latitudine postica duplo brevior, crebre subtiliter sed distinctissime punctato, lateribus rectis. φ . Long. $2\frac{2}{3}$, lat. $1\frac{1}{5}$ mm.

Mandeville.

Praecedenti similis, pronoto brevior, magis transverso, distinctius punctato coloreque pedum posticorum divergens.

19. *Orthotylus compsus* n. sp.

Parvus, gracilis, flavo-virens, nitidulus, superne cum hemielytris longius pallido-pilosus, pilis nigris destitutus; hemielytris ubique sat dense pistazino-irroratis, membrana hyalina, venis albidis, areola minore tota dimidioque apicali areolae majoris pistazinis, dimidio hujus basali hyalino, fascia

transversa tenui albida a parte apicali separata; rostro, antennis totis pedibusque pallido-flaventibus; rostro coxas posticas attingente (superante?), antennis articulo primo capite ab antico viso circiter duplo brevior, setis nonnullis ornato, secundo margini basali pronoti aequae longo, femoribus posticis (♀) dilatatis, margine punctis paucis pistazinis signatis, tibiis anticis muticis, posterioribus nigro-spinulosis; tarsis totis pallidis, articulis duobus ultimis longitudine subaequalibus, unguiculis minutis; vertice (♀) aequali; pronoto basi longitudine saltem duplo latiore. ♀. Long. $2\frac{2}{5}$, lat. vix 1 mm.

Kingston.

Species parva et gracilis, pallida, signaturis obscure viridibus hemielytrorum areolaeque majore fascia transversa in duas partes divisa, quarum inferiore colorata, distinctissima.

20. *Orthotylus divergens* n. sp.

Lividus, sat nitidus, hemielytris flavo-pubescentibus; oculis fusco-nigris, maris maximis, usque in gulam extensis; rostro, antennis pedibusque colore corporis, femoribus anterioribus innotatis vel apice atomis fuscis parce adspersis, posticis, basi excepta, atomis fuscis dense conspersis, tibiis spinulis concoloribus pallidis, his spinulis e punctis minutis nigris nascentibus, tibiis tamen apicem versus inpunctatis, tarsis solum unguiculis nigris; scutello basique hemielytrorum usque ad apicem scutelli fusco-sanguineis, saepe etiam clavo, commissura excepta, corio interne cuneoque magis minusve sanguineo-conspurcatis, membrana cum areolis venis fusco-sanguineis; vertice immarginato, oculo fere nonnihil angustiore (♂) vel hoc circiter duplo latiore (♀); rostro apicem coxarum posticarum attingente; antennis (♀) articulo secundo margini basali pronoti aequae longo, duobus ultimis simul sumtis secundo longitudine aequalibus, tertio quarto duplo longiore; pronoto basi longitudine duplo latiore, lateribus rectis. Long. ♂ ♀ vix $2\frac{1}{2}$, lat. $\frac{4}{5}$ —1 mm.

Kingston.

Species signatura pedum distinctissima.

21. *Platyscythus* nov. gen

Corpus parvum, ovale, superne deplanatum, sat nitidum, laeve et glabrum, pronoto disco postico versus apicem levissime declivi; capite basi pronoti angustiore, a supero viso pronoto duplo brevior et longitudine sua fere triplo latiore, vertice sat lato, aequali, antice inter oculos haud prominulo et margine levissime arcuato; capite ab antico viso fortiter transverso, a latere viso sat fortiter retrorsum vergente, inferne quam superne brevior ibique altitudine basali multo brevior, clypeo parum prominulo, genis (♀) oculo aequae altis, gula haud distinguenda; oculis apici pronoti subcontiguus, parvulis, a supero visis margine interiore retrorsum valde divergentibus, a latere visis reniformibus, in genas parum extensis, ab antico visis orbita interiore subparallelis; rostro gracili, coxas posticas attingente; antennis gracilibus, paullo supra apicem oculorum interne insertis, articulo primo apicem clypei haud attingente, secundo versus apicem sensim levissime incrassato, ultimis simul sumtis secundo paululum longioribus; pronoto sub-plano, fortiter transverso, subsemilunari, margine basali late sinuato, strictura apicali destituto, lateribus margine acutis, postice latiuscule sublimbatus, callis sat elevatis, transversis, medio margine confluentibus, antice medio impressione, postice totis impressione transversa terminatis; scutello pronoto paullo longiore, basi detecta; hemielytris basi pronoti nonnihil latioribus, lateribus levissime rotundatis, venis nullis elevatis, sutura clavi scutello parum longiore, embolio a corio parum discreto, margine exteriori tenuiter incrassato, cuneo subhorizontali, latitudine basali distincte longiore, fractura ejus anguloque basali membranae in linea eadem transversali positae, membrana biareolata; pedibus mediocribus, innotatis, femoribus posticis leviter incrassatis, tibiis tenuiter spinulosis, unguiculis minutis.

Genus pronoto semilunari insigne, verisimiliter hujus divisionis. Areolam alarum unguiculosque haud examinare potui.

Platyscytus binotatus n. sp.

Stramineus, nitidulus, superne subglaber, hemielytris tenuiter flavo-pubescentibus, antennis pedibusque concoloribus, oculis nigro-fuscis; macula triangulari apicali scutelli rufo-castanea, puncto utrinque ad basin hujus maculae maculaque minuta rotundata in medio corii posita rubris; membrana hyalina, signatura angulata anguli interioris striaque undulata apicem areolae majoris maculamque hyalinam ad apicem cunei positam terminante nigricantibus; vertice feminae oculo saltem duplo latiore; articulo secundo antennarum margini basali pronoti aequae longo, tertio secundo fere duplo brevior. ♀. Long. $2\frac{2}{3}$, lat. 1 mm.

Kingston.

22. *Melanostictus* n. g.

Corpus elongatum, gracile, superne planiusculum, in punctatum, nitidum, pallidissime pilosulum, pilis retrorsum vergentibus; capite basi pronoti paullulum angustiore, verticali, a supero viso longitudine circiter duplo latiore, pronoto circiter $\frac{1}{4}$ brevior, pone oculos brevissime constricto, sulco medio longitudinali sat obsoleto instructo, margine postico tenuiter carinato; capite ab antico viso latitudine frontis oculique unici vix longior, infra oculos sat breviter producto; a latere viso altitudine fere duplo brevior, fronte clypeoque perpendicularibus, hoc leviter prominente, a latere viso lineari, basi fere in medio altitudinis capitis posita, angulo faciali recto, genis humilibus, gula brevi, obliqua; oculis granulatis, maris magnis, exsertis, a supero visis fere orbicularibus, a latere visis oblongis, in genas longius extensis, orbita interiore a medio apicem versus divergentibus; rostro gracili, piloso, coxas posticas attingente, articulo primo caput vix superante; antennis gracilibus, ad tertiam apicalem partem oculorum interne insertis, articulo primo capiti a supero viso aequae longo, secundo lineari, margine basali pronoti sat multo longior, tertio secundo brevior et quarto vix longior; pronoto transverso, breviter trapeziformi, lateribus marginatis, subrectis, margine acuto, strictura apicali

nulla, callis distinctis, sed parum convexis, tertiam apicalem partem haud superantibus, margine postico eorum impresso, disco sulco latera superante destituto, disco postico planiusculo, versus apicem levissime declivi, margine basali truncato; scutello plano, pronoto aequae longo; hemielytris semi-pellucen-tibus, parallelis, embolio lineari, angustissimo, sutura clavi scutello distincte longiore, vena cubitali corii nonnihil ele-vata, cuneo elongato-triangulari, membrana biareolata, areola minore angusta, majore angulo interiore apicali rotundato; xypho prosterni plano; metastethio orificiis distinctis; coxis anticis medium mesosterni superantibus, posticis ab epipleuris hemielytrorum modice remotis; pedibus gracilibus, femoribus linearibus, tibiis tenuissime spinulosis, tarsis gracillimis, li-nearibus, unguiculis brevibus.

Genus corpore gracili, elongato, capite pone oculos bre-vissime constricto, pronoto lateribus marginato, hemielytris subpellucen-tibus etc. distinguendum.

Melanostictus Van Duzeei n. sp.

Pallidissime et dilutissime virescens, nitidus, superne pallidissime pilosulus, oculis, scutello, angulis basalibus ex-ceptis, maculaque communi rotundata commissuram corii oc-cupante nigris, membrana hyalina, areolis dilutissime virescen-tibus, puncto minuto anguli basalis interioris areolae majoris maculaque parva rotundata ad angulum interiorem ejusdem apicalem fuliginosis. ♂. Long. $2\frac{3}{4}$, lat. fere 1 mm.

Mandeville.

23. Hyalochloria nov. gen.

Corpus ovale, tenue, nitidum, laeve, parce tenuiter pu-bescens; capite pronoto angustiore, verticali, a supero viso pronoto brevior et longitudine sua circiter duplo latiore, antice inter oculos vix prominente, margine antico latissime et levissime arcuato, pone oculos parvulos in collum latum constricto, collo marginibus retrorsum leviter convergentibus, vertice lato, sulculo medio longitudinali instructo vel inter oculos late transversim excavato; capite ab antico viso trans-

verso, a latere viso altitudine basali brevior, fronte clypeoque perpendicularibus, hoc parum prominente, levissime arcuato, basi in medio altitudinis capitis posita, angulo faciali recto, loris breviter discretis, genis (♀) oculo paullo humilioribus, gula vix distinguenda; oculis laevibus, sat exsertis, parvulis, a superno visis semiorbicularibus, obliquis, margine interiore retrorsum sat fortiter divergentibus, a latere visis subreniformibus, perpendicularibus, in genas breviter extendis; rostro gracili, articulo primo caput parum superante, antennis modice longis, gracilibus, tenuiter pilosulis, paullo supra apicem oculorum interne insertis, articulo primo subcylindrico, crassiore, secundo margine basali pronoti brevior, ultimis secundo paullo gracilioribus, tertio hoc circiter $\frac{1}{3}$ brevior, quarto tertio paullo vel parum brevior; pronoto transverso, apice quam basi duplo angustior, lateribus late leviter sinuatis, margine basali supra scutellum fortiter sinuato, versus latera rotundato, limbo basali utrinque ad angulos impresso, apice strictura destituto, callis elevatis ad unum confluentibus et tylum transversum in latera extensum formantibus, postice a sulco transversali terminatis, hoc sulco tamen marginem lateralem haud superante, disco postico tylo haud vel parum longior, versus sulcum transversalem leviter declivi; scutello pronoto aequae longo vel hoc paullo longior, parte basali (mesonoto) late detecta; hemielytris explanatis, diaphanis, basi pronoti paullo minus quam duplo latioribus, apicem abdominis sat longe superantibus, lateribus late rotundatis, margine tenuiter pilosulo, venis elevatis nullis, embolio optime discreto, sat anguste explanato, clavo commissura scutello aequae longa, corio margine apicali interne obliquo impresso, cuneo latitudine basali longior, membrana areolis viridi-vel virescenti-coriaceis, elongatis, subconfluentibus, vena cubitali vix distinguenda; xypho prostethii disco concavo; metastethio orificiis minutis; coxis anticis medium mesosterni attingentibus, posticis a latere corporis leviter remotis; pedibus gracilibus, tibiis muticis vel spinulis tenuissimis instructis, tarsis linearibus, posticis tibia circiter quadruplo brevioribus, unguiculis minutis, aroliis conuiventibus; terebra feminae medium ventris attingente.

Genus structura capitis, pronoto laevi, margine ejus postico sinuato, hemielytris diaphanis, explanatis, areolis membranae confluentibus, haud hyalinis, sed corio et cuneo assimilibus, distinctissimum; a quibusdam generibus divisionis *Bryocoraria*, quibus statura, hemielytris explanatis membranaeque subuniareolata nonnihil simile, structura tarsorum mox distinguendum.

Hyalochloria caviceps n. sp.

Ovalis, dilute virescens, hemielytris diaphanis, dilute virescentibus, membrana hyalina, margine interiore tenuiter nigricante, areolis viridi-coriaceis, elongatis, vena cubitali vix distinguenda; antennis articulis duobus ultimis saepeque etiam basi et apice secundi nigricantibus; extremo apice scutelli viridi vel nigricante; capite pone oculos in collum breve constricto, collo oculo magis quam duplo brevior, vertice oculo saltem $2\frac{1}{2}$ latiore, inter oculos late excavato, margine late arcuato; antennis articulo secundo margine basali pronoti circiter $\frac{1}{4}$ brevior; pronoto callis in tylum transversum in latera extensum confluentibus, postice sulco continuo terminatis. ♀. Long. $2\frac{1}{3}$, lat. 1 mm.

Mandeville.

Caput basi pronoti fere $\frac{1}{3}$ angustius, ab antico visum latitudini frontis oculique unici aequae longum, a latere visum altitudine basali fere duplo brevius. Pronotum latitudine basali saltem duplo brevius; sulco transversali mox ante medium posito. Scutellum pronoto paullo longius. Tibiae saltem posticae tenuiter sed sat longe pallido-spinulosae.

24. *Hyalochloria unicolor* n. sp.

Ovalis, dilute virescens, nitidus, superne cum hemielytris tenuiter albo-pubescentibus, membrana hyalina, margine interiore concolore, aroliis nitidis, dilute virescentibus, diaphanocoriaceis, quam corio et cuneo haud obscurioribus; antennis totis pallidis; collo capitis oculo aequae longo, vertice plano, oculo magis quam triplo latiore, sulculo medio longitudinali instructo; antennis articulo secundo margine basali pronoti

paullo brevior; pronoto callis in tylum convexum confluentibus, postice sulco continuo terminatis. ♀. Long. 3, lat. fere $1\frac{1}{2}$ mm.

Mandeville, 1 ♀.

Caput basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$ angustius, ab antico visum latitudine frontis oculique unci distincte brevius, a latere visum altitudine basali circiter $\frac{1}{3}$ brevius. Pronotum latitudine basali fere duplo brevius, sulco transversali in medio posito. Scutellum pronoto aequae longum. Tibiae muticae.

25. Mesotropis nov. gen.

Corpus oblongo-ovale, tenue, nitidum, laeve, subglabrum; capite pronoto angustiore, verticali, a superno viso pronoto paullo brevior et longitudine sua circiter dimidio latiore, antice inter oculos leviter prominulo et margine late arcuato, pone oculos in collum sat longum constricto, collo marginibus retrorsum sat fortiter convergentibus, vertice modice lato; capite ab antico viso latitudini frontis oculique unci aequae longo, a latere viso altitudini basali longitudine subaequali, fronte et clypeo perpendicularibus, hoc sat prominente, lineari, basi in medio altitudinis capitis posita, genis sat humilibus, gula brevi, horizontali; oculis minute granulatis, in medio laterum capitis positus, sat parvulis, a superno visis obliquis, margine interiore retrorsum fortiter divergentibus, a latere visis subreniformibus, in genas sat longe extensis, ab antico visis orbita interiore recta apicem versus levissime divergentibus; rostro gracili, articulo primo caput parum superante; antennis gracilibus, sat longe supra apicem oculorum interne insertis, articulo primo capiti a latere viso aequae longo, secundo sublineari; pronoto transverso, apice quam basi saltem duplo angustiore, lateribus basim versus late sinuatis, margine basali truncato, limbo basali utrinque ad angulum impresso, apice strictura destituto, sed limbo tenui depresso, callis in tylum convexum ad unum confluentibus, postice sulco profundo terminatis, sulco medio carinula longitudinali disjuncto, usque ad marginem lateralem extenso, margine hoc loco acuto, disco postico versus sulcum levissime declivi; scutello pronoto paullo brevior, basi detecta; hemielytris dia-

phanis, explanatis, basi pronoti circiter dimidio latioribus, apicem abdominis sat longe superantibus, lateribus leviter rotundatis, venis elevatis nullis, embolio optime discreto, sat anguste explanato, commissura clavi scutello paullo longiore, cuneo latitudine basali longiore, membrana cum areolis hyalina, his confluentibus, angulo interiore apicali arcuato, vena cubitali solum apice distinguenda; xypho prosterni disco concavo; coxis anticis medium mesosterni attingentibus; pedibus gracilibus, tibiis submuticis, tarsis linearibus, unguiculis minutis, aroliis conniventibus; terebra feminae brevi, medium ventris haud attingente.

Generi *Hyalochloria* m. affinis et similis, differt autem capite a latere viso altitudini basali aequae longo, pronoto margine basali truncato nec sinuato, sulco pronoti medio carina elevata longitudinali instructo hemielytrisque minus late explanatis.

Mesotropis viridifasciatus n. sp.

Oblongo-ovalis, dilutissime virescens, nitidus, subglaber, hemielytris hyalinis, commissura clavi tenuiter, margine interiore embolii, fascia transversali mox supra tertiam apicalem partem corii, marginibus basali et exteriori cunei venisque membranae smaragdinis; antennis articulo primo externe, basi secundi externe ultimisque, basi tertii excepta, tarsis articulo ultimo nigris; collo capitis oculo a supero viso saltem aequae longo, oculis fuscis, vertice inter oculos aequali, oculo vix magis quam dimidio latiore (♀); antennis articulo secundo margine basali pronoti paullo longiore. ♀. Long. 2 ³/₄, lat. 1 mm.

Kingston. 1 ♀.

Div. **Plagiognatharia** Reut.

26. Psallus atomophorus n. sp.

Pallide stramineus, opacus, superne pilis brevibus aureis facillime divellendis pubescens, hemielytris nigro-pubescentibus; capite apiceque pronoti dilute aurantiacis; pronoto, scutello hemielytrisque ubique punctis minutis vel ato-

mis fuliginosis dense conspersis, corio mox infra medium fascia vel maculis duabus vena cubitali disjunctis umbrinis notato, cuneo basi anguste albicante; membrana cum areolis obscure fumata, venis cubitali et connectente, macula majore inter apicem cunei et areolam minorem aliaque minore in medio limbi exterioris albidis; antennis albidis, punctis tribus articuli primi imaque basi secundi nigris (tres ultimi mutilati); pedibus albidis, femoribus atomis fuliginosis dense conspersis, margine anteriore punctis in seriem positis nigris setam nigram ferentibus, tibiis spinulis nigris e punctis sat magnis nigro-fuscis nascentibus, tarsis articulo ultimo apice infuscato; ventre medio virescente; capite maris basi pronoti circiter $\frac{1}{4}$ angustiore, vertice oculo paullulum latiore; segmento maris genitali inferne mutico, glabro. ♂. Long. $2\frac{1}{4}$, lat. 1 mm.

Kingston.

Ps. guttuloso Reut. dimidio minor, opacus, pronoto fortius transverso, vitta longitudinali albida destituto, clavo et corio usque in basin atomis fuscis conspersis, corio infra medium umbrino-fasciato, membrana antennisque aliter signatis.

27. *Psallus* (?) *sulphureus* n sp.

Oblongus (♂) vel oblongo-ovatus (♀), sulphureus, nitidulus, hemielytris tomento albo plerumque toto detrito, sat parce nigro-pubescentibus, atomis minutis nigricantibus ubique conspersis, solum cuneo macula majore innotata, margine ejus interiore puncto vel striola minuta nigricante notato, membrana cum areolis sat leviter fumata, atomis minutis nigricantibus aequaliter irrorata, venis sulphureis, macula obliqua inter cuneum et areolam minorem aliaque minore media limbi exterioris albidis, his maculis postice obscurius nigricanti-terminatis; femoribus intermediis apicem versus posticisque maximam ad partem atomis minutis dilute nigricantibus conspersis, tibiis tenuiter pallido-spinulosis, spinulis tibiarum posteriorum e punctis sat parvis nigris nascentibus, tarsis cum unguiculis pallidis; capite basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$ angustiore, ab antico viso pronoto distincte longiore et latitudini suae posticae aequae longo (♂) vel hac paullo longiore

(♀), vertice oculo duplo (♂) vel magis quam duplo (♀) latiore; oculis minute sed distincte granulatis; rostro longo, medium segmenti genitalis (♂) vel medium ventris attingente (♀), antennis articulo secundo margine basali pronoti perparum longiore; pronoto basi longitudine saltem duplo latiore; segmento maris genitali inferne mutico, glabro. ♂ ♀. Long. 3, lat. ♂ 1, ♀ $1\frac{1}{3}$ mm.

Kingston, plura specimina.

Species colore insigni, capite rostroque longioribus femoribusque puncto setifero anteapicali marginis superioris destitutis ab affinibus divergens.

28. *Atomoscelis diaphanus* n. sp.

Ovalis, dilute virescens, flavo-pubescens, capite in pallide flavescentem vergente; antennis pallide stramineis, articulo primo puncto interiore imaeque basi secundi nigris, articulo secundo latitudine capitis paullulum longiore, duobus ultimis fuscis, tertio secundo circiter $\frac{1}{4}$, quarto tertio $\frac{2}{5}$ brevior; hemielytris subdiaphanis, apice commissurae clavi nigro, membrana hyalina, puncto fusco paullo infra apicem venae cubitalis; pedibus albidis, femoribus dimidio apicali inferne atomis punctisque nonnullis nigris signatis, superne puncto marginis posterioris ante apicem et duobus — quatuor marginis anterioris, quorum duobus apicalibus setulam nigram ferentibus; tibiis sat longe nigro-spinulosis, spinulis versus basin tibiarum e punctis nigris distinctis nascentibus, tarsis apice articuli ultimi nigro-fusco; capite feminae basi pronoti angustiore, genis oculo saltem dimidio humilioribus. ♀. Long. 3, lat. $\frac{2}{5}$ mm.

Mandeville.

A. onusto H. S. statura et etiam apice nigro clavi similis, differt corpore multo majore, hemielytris diaphanis, immaculatis, membrana aliter signata, genis humilioribus, etc.

29. *Leucopocila* n. gen.

Corpus parvum, maris oblongum, feminae breve, hemielytris subparallelis, sat nitidum, subglabrum vel scutello hemie-

lytrisque sat parce pubescentibus; capite lato, basi pronoti haud vel paullulum angustiore, verticali, a supero viso pronoto $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ brevior, vertice lato, submarginato, antice subtruncato; capite ab antico viso fortiter transverso, a latere viso altitudine basali paullo minus quam duplo brevior, fronte perpendiculari, leviter convexiuscula, apice capitis compresso, clypeo brevi, leviter prominulo, basi cum fronte subconfluente, loris optime discretis, genis mediocribus, gula brevi, suberecta; oculis laevibus, a supero visis transversis, nonnihil retrorsum vergentibus, in genas modice extensis, orbita interiore apicem versus sat fortiter divergentibus; rostro apicem coxarum posticarum attingente vel paullo superante, articulo primo crasso caput longe superante; antennis ad apicem oculorum interne insertis, articulo secundo primo solum duplo longiore, articulis duobus primis maris validis, primo crasse obconico, apicem clypei fere dimidio apicali superante, secundo fortiter dilatato, jam a basi primo aequae crasso, versus apicem attenuato, articulis iisdem feminae modice incrassatis, primo apicem clypei parum superante, secundo a basi graciliore versus apicem fortiter incrassato, articulis ultimis sat gracilibus, tertio secundo aequae longo; pronoto trapeziformi, fortiter transverso, apicem versus leviter declivi, apice quam basi paullulum — $\frac{1}{6}$ angustiore; scutello pronoto aequae longo, basi detecta; hemielytris abdomen longe superantibus (σ) vel apicem ejus solum attingentibus (φ), cuneo latitudini basali aequae longo (φ) vel hac paullo longiore (σ), membrana biareolata; coxis anticis medium mesosterni longe superantibus; pedibus mediocribus, femoribus posticis incrassatis, tibiis punctis nigris destitutis, tenuiter fusco-spinulosis; tarsis posticis longis, tibia solum dimidio brevioribus, articulo primo brevi, secundo tertio aequae longo, unguiculis leviter curvatis, aroliis parum distinguendis.

Generi *Chlamydatus* Curt. similis, vertice aequali, immarginato, fronte minus convexa, structura insigni antenarum tarsisque longis distincta; a gen. *Strongylotes* Reut. capite lato, ab antico viso fortiter transverso, a gen. *Rhinacloa* Reut. corpore pilis fragilibus destituto, oculis minoribus, laevibus, genis altioribus, gula distincta, rostro longiore etc. distinguenda.

Leucopoeila albofasciata n. sp.

Nigricans, nitidus, antennis totis, rostro, coxis femoribusque nigris. his extremo apice, tibiis tarsisque pallide flavo-testaceis, tibiis posticis basin versus articuloque ultimo tarsorum nigro-fuscis; spinulis tibiarum posticarum e punctis minutissimis nigricantibus nascentibus; hemielytris nigro-fuscis, cum scutello breviter minus tenuiter flavo-pubescentibus; corio subtiliter punctulato, fascia transversali ante medium corii et clavi maculaque corii supra basin cunei albidis, membrana cum areolis venisque fumata. ♂ long. 2, lat. 1, ♀ long. 1½, lat. 1 mm.

Kingston.

30. *Sthenarus plebejus* n. sp.

Ovalis, piceo-niger, nitidus, articulis intermediis rostri duobusque primis antennarum, femoribus totis vel apice late, tibiis tarsisque pallide ochraceis, articulis ultimis antennarum raroque secundo apicem versus fuscentibus, tibiis punctis destitutis, spinulis concoloribus pallidis armatis, tibiis posticis interdum picescentibus, tarsis apice fuscis; capite basi pronoti circiter ¼ angustiore, margine verticis tenui latissime arcuato; rostro coxas posticas longius superante; antennarum articulo secundo latitudini basali capitis cum oculis aequae longo; pronoto disco postico subtilius ruguloso, angulis basalibus interdum anguste pallidis; hemielytris squamulis aureis facillime divellendis parcius vestitis. ♀. Long. 1¼, lat. fere 1 mm.

Mandeville, plura spec; Tambillo, D. Otto, 1 spec. (Mus. Vindob.).

31. *Sthenarus basalis* n. sp.

Ovalis, piceo-niger, nitidus, capite testaceo, vertice picescente, oculis nigro-fuscis; rostro, articulis duobus primis antennarum (ultimi desunt) pedibusque cum coxis pallide testaceis, articulo secundo antennarum latitudini verticis oculique unici fere aequae longo, versus apicem distincte incrassato et tertia apicali parte piceo-nigro; femoribus posticis punctis

4—5 apicalibus, quorum duobus marginis antici, nigro-piceis, tibiis spinulis sat longis nigris e punctis minutis nigris nascentibus, tarsis apice nigris; hemielytris squamulis argenteis facillime divellendis parcius vestitis, clavo tertiaque basali parte embolii et corii, corio juxta suturam clavi nec non lunula basali cunei pallide testaceis, margine scutellari commissuraque clavi tenuissime nigro-piceis, membrana cum areolis pallida, tertia apicali parte griseo-fumata, venis pallide testaceis, brachiali apice connectenteque tota nigro-piceis; capite basi pronoti circiter $\frac{1}{4}$ angustiore, margine verticis tenui levissime arcuato, vertice oculo circiter $\frac{2}{3}$ latiore, pronoto disco postico subtiliter ruguloso. ♀. Long. $1\frac{4}{5}$, lat. fere 1 mm.

Mandeville.

Species colore hemielytrorum et praecipue membranae, capite pallido, tibiis totis minute nigro-punctatis etc. a reliquis facile distinguenda.
