

basali instructo; hemielytris lateribus late arcuatis, embolio lineari, incrassato et reflexo, cuneo fortiter declivi, latitudine basali fere brevior; coxis anticis brevibus; pedibus modice gracilibus, tibiis subtilissime pubescentibus, muticis, tarsis modice brevibus, articulo primo fisso, secundum usque ad medium ejus includente, tertio oblongo, versus apicem modice incrassato, aroliis cum unguiculis connexis, his apice libero uncinatis.

Generi *Aspidobothrys* m.¹⁾ affinis, differt autem capite latitudini cum oculis aequae longo, apice pronoti strictura bene discreta annuliformi destituto pedibusque longioribus, minus robustis, tibiis subtiliter pubescentibus, tarsis magis elongatis; a genere *Pachymerocerus* m.²⁾ structura antennarum, rostro brevior, strictura pronoti apicali postice haud discreta distinguendus; a genere *Tenthecoris* Scott basi clypei in medio capitis a latere visi posita, rostro aliter constructo, tibiis pallido pilosulis divergens.

Dichroocoris coeruleipennis n. sp. Sat breviter ovatus, inferne niger, nitidus, capite, pronoto et prosterno flavo-aurantiacis vel obscure ochraceis, oculis nigris, rostro picescenti-rufis; pedibus cum coxis totis lividis vel albido-flaventibus; scutello hemielytrisque valde nitentibus, cyaneis, membrana decolore, sordide albicante, venis areolaeque nigris; vertice oculo circiter triplo latiore; pronoto disco postico crebre sat subtiliter punctato; hemielytris laevibus, subtilissime griseo-pubescentibus; pedibus pallido-pubescentibus. ♂. Long. $3\frac{1}{2}$, lat. hemielytrorum $1\frac{4}{5}$ mm.

Orizaba, m. Maji, 1 ♂.

Tenthecori generoso (Stål) sat similis, sed minor, pedibus pallidis notisque genericis mox distinguendus.

Sisynas Dist., Reut.

Reut., Caps. in Bras. coll., 1907, p. 36.

Sisynas limbaticollis n. sp. Oblongus, niger, nitidulus, capite, clypeo verticeque toto vel limbo basali exceptis, limbis lateralibus usque in stricturam callisque pronoti, prosterno, limbo coxali hemielytrorum anguste pedibusque cum coxis sordide lividis vel pallide lutescentibus, tibiis apice (posticae desunt) tarsisque fuscis; hemielytris nigris, sublaevibus vel omnium obsoletissime punctulatis, membrana tota nigricante; capite basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustiore, oculis levissime retrorsum vergentibus, vertice oculo vix duplo et dimidio latiore, fortiter convexo, maris medio distincte impresso; rostro apicem coxarum anticarum attingente, nigro-piceo, articulo secundo maris parallelo, primo aequae longo et duobus ultimis simul sumtis distincte brevior; antennis fere ad tertiam apicalem partem marginis interioris oculorum insertis, articulo secundo primo aequae crasso, latitudini verticis oculique unci aequae longo; pronoto latitudine basali circiter $\frac{3}{7}$ brevior, disco postico leviter convexo et apicem versus leviter declivi, sublaevi vel obsoletissime punctulato; limbo basali versus latera nonnihil adpresso; scutello hemielytrisque sublaevibus, illo impressione distincta trigona basali. ♂. Long. $7\frac{1}{3}$, lat. hemielytrorum $2\frac{2}{3}$ mm.

Orizaba, m. Junii, 2 sp.

Mala Dist.

Generi *Neofurius* Dist. simillima, differt corpore superne toto cum scutello hemielytrisque nitido, capite a supero viso inter antennis magis prominulo, latitudini inter-

¹⁾ Hem. in Brasil. coll., 1907, p. 33.

²⁾ Ined. typus: *Eccritotarsus Fairmairei* Stål.