

antennis articulo secundo latitudine interoculari verticis vix longiore; pronoto latitudine circiter $\frac{1}{3}$ brevior, crebre subtiliter punctato. ♀. Long. $2\frac{3}{4}$, lat. $1\frac{1}{4}$ mm.

Orizaba, m. Maji.

Pycnoderes Guér.

Reut., Hem. in Brasil. coll., 1907, p. 41.

Pycnoderes monticulifer n. sp. Oblongo-ovalis, niger, sat nitidus; capite basi pronoti circiter dimidio angustiore, ab antico viso latitudini cum oculis aequae longo, marginibus verticis ad oculos anguste apiceque late sordide testaceis, fronte sulco basali longitudinali instructa; pronoto crebre punctato, disco postico alte inflato-convexo, medio et lateribus ante angulos late et profunde impresso, gibbis intermediis altis, rotundatis, versus apicem fortiter convexo-declivibus, margine eorum postico illo antico circiter solum $\frac{2}{5}$ brevior, subperpendiculariter arcuato, mox ante basin subito antrorsum declivi; scutello bene distincto, sat subtiliter punctato; hemielytris fusco-nigris, opacis, embolio, basi excepta, usque ad medium maculaque subquadrata anteapicali, cuneo membranaeque albis, margine basali cunei anguste anguloque interiore areolae membranae nigricantibus; rostro, antennis pedibusque cum coxis totis albis; articulo secundo antennarum latitudini verticis oculique unici aequae longo, articulis ultimis fuscescentibus. Long. $2\frac{3}{4}$, lat. hemielytrorum $1\frac{1}{4}$ mm.

Mexico, 1871 et 1883, plura specimina.

P. incurvo Dist. similis, statura distincte angustiore et magis oblonga, articulo secundo antennarum brevior, macula anteriore embolii longior, medium attingente femoribusque posticis totis albis mox distinguendus; a *P. Simoni* Reut. gibbis pronoti altis optime distinctus.

Pycnoderes incurvus (Dist.). Oblongo-ovalis, niger, sat nitidus; capite basi pronoti dimidio angustiore, ab antico viso latitudini posticae fere aequae longo, sordide testaceo, vertice medio vittisque tribus frontis nigris; pronoto fortiter punctato, disco postico alte inflato-convexo, medio et lateribus ante angulos late et profunde impresso, gibbis intermediis altis, rotundatis, margine eorum postico a latere viso illo antico plerumque solum paullulum brevior et retrorsum declivi, mox ante basin subito breviter antrorsum vergente; scutello bene distincto, punctato; hemielytris fusco-nigris, locis sericeo-cinerascentibus variegatis, embolio macula anteriore medium haud attingente aliaque plerumque minore anteapicali, cuneo membranaeque albis, margine basali cunei nigricante; rostro, antennis pedibusque cum coxis albis, articulo secundo antennarum latitudini capitis longitudine subaequali, ultimis fuscescentibus, femoribus posticis ante apicem late nigris. Long. $2\frac{4}{5}$ — $3\frac{3}{5}$, lat. $1\frac{1}{2}$ — $1\frac{2}{3}$ mm.

Eccritotarsus incurvus Dist., Biol. Centr. Amer., Het., p. 285, 8, Tab. XXVI, Fig. 19.

Mexico, 15 sp.

A praecedente statura majore et latiore, gibbis pronoti retrorsum magis sensim rotundatis et minus subito declivibus, nec non femoribus posticis nigro-annulatis divergens.

Pycnoderes atratus (Dist.). Ovalis, niger, capite basi pronoti duplo angustiore, fronte marginibus utrinque angustissime testaceis; pronoto pone callos minutos fortiter tumido-convexo, crebre punctato, disco basali impressionibus destituto; scutello brevissimo; hemielytris opaculis, embolio anguste explanato, reflexo, gutta parva ante-