

Caput (σ^7) nutans, basi pronoti $\frac{3}{7}$, angustius, a supero visum pronoto $\frac{1}{3}$ brevius et longitudine sua dimidio latius, vertice oculo circiter dimidio latiore; ab antico visum latitudini cum oculis saltem aequae longum, a latere visum altitudini aequae longum, fronte versus apicem leviter declivi, clypeo usque a basi sat fortiter prominente, ipsa basi in tertia superiore parte altitudinis capitae a latere visi posita, angulo faciali subrecto, genis mediocribus, gula peristomio aequae longa et in plano illius posita. Oculi maris modice exserti et leviter convexi, a supero visi orbiculares, a latere visi obliqui, in genas modice extensi. Rostrum coxas posticas paullo superans. Antennae articulo secundo margine basali pronoti circiter dimidio longiore, tertio secundo circiter $\frac{1}{3}$ breviorae. Pronotum latitudine basali vix magis quam $\frac{1}{4}$ brevius, lateribus leviter latissime sinuatis, disco versus apicem leviter declivi, postice leviter convexo. Hemielytra maris abdomen longe superantia, scutello saltem quintuplo longiora. Femora maris postica latitudine maxima circiter sextuplo longiora. Tibiae postice spinulis crassitiei basali tibiae aequae longis. Tarsi margine inferiore articuli primi eidem secundi aequae longo, articulo tertio secundo longiore. Segmentum maris genitale ad medium marginis anterioris sinus sinistri apertura tuberculo acuto instructum.

Phytocoris moesticolor n. sp. Superne nigro-fumatus, opacus, breviter nigropilosus, pilis hemielytrorum retrorsum vergentibus, parce albido-tomentosus, capite et pronoto fere unicoloribus vel capite guttis nonnullis minutis albidis; scutello apice pallido; hemielytris solum maculis limbi costalis basisque cunei sordide albidis, corio macula obliqua ovali media aliaque apicali subquadrata oblique posita et in angulum interiorum cunei nonnihil extensa nitidulis, nonnihil dilutioribus, membrana cum areolis minute hyalino-conspersa, venis grisescentibus vel pallidis, cubitali nigricante; antennis articulo primo gracili, lineari, albo- et nigro-variegato, pronoto aequae longo, secundo primo fere $\frac{2}{3}$ longiore, testaceo, basi anguste albido, annulo angustissimo subbasali parteque circiter quarta apicali nigris, articulis ultimis fuscis, simul sumtis secundo aequae longis, tertio primo paullulum longiore, basi omnium angustissime pallido; pectore ventraeque fusco-nigris, maculis albidis adpersis; coxis femoribusque fusco-nigris, illis basi sordide albidis, his guttis sordide albidis conspersis, basin versus albicantibus; tibiis superne dense nigro- et albido-variegatis, inferne sordide albidis, spinulis fuscis, in certa directione luminis testaceis, crassitiei tibiae parum longioribus, tarsis pallidis, articulo primo apiceque tertii nigro-fuscis. σ^7 φ . Long. $6\frac{2}{3}$, lat. $2\frac{1}{3}$ mm.

Chapultepek, m. Octobris, 3 sp.; Orizaba, m. Novembris, 1 sp.

Ph. misto Dist. similis videtur, colore autem antennarum distinguendus. Corpus oblongo-ovale vel (φ brachyptera) oblongo-obovatum. Caput nutans, a supero visum pronoto circiter $\frac{1}{3}$ — parum (σ^7) brevius, latitudini verticis oculique unici aequae longum, vertice oculo circiter dimidio (σ^7) vel duplo (φ) latiore; ab antico visum latitudine cum oculis fere nonnihil longius; a latere visum altitudini basali aequae longum, fronte leviter declivi, apice subperpendiculari, clypeo usque a basi fortiter prominente, angulo faciali subrecto, genis mediocribus. Oculi a supero visi orbiculares, a latere visi oblongo-ovati, in genas modice extensi. Rostrum apicem coxarum posticarum paullo superans, sordide albicans, apicem versus fuscens. Antennae setis rigidis articuli primi crassitiei articuli paullo longioribus, articulo secundo margine basali pronoti circiter $\frac{1}{3}$ (φ) vel $\frac{2}{5}$ (σ^7) longiore. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{1}{4}$ vel (φ brachypterae) $\frac{1}{3}$ brevius, lateribus late sinuatis. Hemielytra abdomen sat longe superantia, feminae interdum abdomine paullulum longiore. Femora postica latitudine maxima